

Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Heidelberg.

(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. v. Krehl.)

---

# Über die Wirkung der Digitalis auf die verschiedenen Formen von Herzerkrankung.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen medizinischen Fakultät


der

Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg

vorgelegt von

**Theophil Schrenk**

aus Marburg a. d. L.



München 1913.

E. Mühlthaler's Buch- und Kunstdruckerei A.G.



Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Heidelberg.  
(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. v. Krehl.)

---

# Über die Wirkung der Digitalis auf die verschiedenen Formen von Herzerkrankung.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen medizinischen Fakultät


der

Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg

vorgelegt von

**Theophil Schrenk**

aus Marburg a. d. L.



München 1913.

E. Mülhthaler's Buch- und Kunstdruckerei A.G.

Gedruckt mit Genehmigung  
der medizinischen Fakultät der Universität zu Heidelberg.

Dekan: Prof. Dr. Kossel.

Referent: Geh. Rat Krehl.

Die Stoffe des Fingerhutes sind ein Mittel für die Besserung der sinkenden Herzkraft. Ihr Anwendungsgebiet umfasst alle Fälle von Kreislaufschwäche, bei denen die Insuffizienz des Herzens im Vordergrund steht. Nach dieser Auffassung wird die Digitalis jetzt auch am Krankenbette verwendet. Ihre glänzendsten Erfolge feiert sie bei den sogen. Kompensationsstörungen mancher Klappenfehler. Was diesen in letzter Linie zu Grunde liegt, wissen wir ja nicht. Jedenfalls ist die Störung reparabel, und zwar durch keine andere Einwirkung auch nur annähernd so wie durch Substanzen der Digitalisgruppe. Das Ausbleiben eines Erfolges dieser Medikation dürfte in erster Linie dadurch begründet sein, dass der Herzmuskel irreparabel erkrankt ist. Aber — nach dem Eindruck zu urteilen — ist das nicht immer, nicht der einzige Grund. Vielmehr dürfte zuweilen auch in anderen Eigentümlichkeiten des kranken Herzens die Veranlassung liegen. Man hat sich neuerdings eingehend mit dieser Frage beschäftigt und hat zunächst gesehen, dass zweifellos bestimmte Beziehungen bestehen zwischen erschwerter oder ausbleibender Digitaliswirkung und bestimmten Störungen der Herzschlagfolge. Davon soll hier nicht oder wenigstens erst in zweiter Linie die Rede sein. Eine andere Frage ist die, ob nicht die Art der Herzerkrankung in einer Beziehung steht zum leichten Eintreten oder Ausbleiben der Digitaliswirkung. Das berührt alte, früher viel erörterte Fragen der Klinik.

Als man früher vom rein ärztlichen Standpunkt aus die Anwendungsweise des Fingerhutes beurteilte, kam man bald auf den Gedanken, dass z. B. bestimmte Klappenfehler für Digitalis geeignet, andere nicht geeignet seien. Die Vorstellung von der schlechten Reaktion der Kranken mit Aorteninsuffizienz hat sich seit C o r r i g a n bis jetzt erhalten. Sonst haben im einzelnen die Anschauungen stark gewechselt, weil mehr nach Eindrücken als nach fixierten Beobachtungen geurteilt wurde.

Einer Aufforderung von Herrn Prof. K r e h l folgend habe ich die seit 1907 in der Heidelberger Klinik mit Digitalis behandelten Krankheitsfälle zusammengestellt, um mir ein Urteil über die genannte Frage zu bilden.

Die Einteilung habe ich so vorgenommen, dass ich zwischen primären Erkrankungen des Herzens (Klappenfehlern, Myokarditis, Perikarditis) und sekundären Herzinsuffizienzen unterschied. Gleichzeitig berücksichtigte ich das Vorhandensein resp. Fehlen von Atherosklerose, besonders bei den so oft mit Atherosklerose verbundenen Erkrankungen, Myokarditis und Nephritis. Man behandelt nämlich vielfach bisher Atherosklerotiker und Nichtatherosklerotiker ohne Unterschied. Nur R o m b e r g macht in seinen Herzkrankheiten darauf aufmerksam, dass bei Atherosklerose und Nephritis die an Kranke verabreichten Gaben Digitalis vorsichtig zu wählen seien. Obwohl nun G o t t l i e b und M a g n u s eine spezifische Gefässwirkung der Digitalis experimentell bewiesen, bestehen noch keine eingehenden klinischen Beobachtungen, ob die Digitalis bei Kranken mit veränderten Gefässen anders wirkt als bei solchen mit gesunden Gefässen. Nach den Erfahrungen an der Heidelberger Klinik besteht ein Unterschied. Herr Dr. A. W. M e y e r wird diesen Punkt in seiner demnächst erscheinenden Abhandlung über die Digitalis ausführlich erörtern.

Als spezielle Kriterien für die Digitaliswirkung dienten uns, wie auch allen anderen Aerzten, Pulsfrequenz und Diurese. Die Amplitude bestimmten wir jetzt nicht mehr regelmässig. Aus den Untersuchungen bei intravenösen Strophanthininjektionen von F r ä n k e l - S c h w a r t z, L u s t, H o e p f n e r, F e l l n e r geht es hervor, dass das Verhalten der Amplitude bei dieser Therapie ein recht brauchbarer Prüfstein ist. Es zeigte sich aber, dass bei der Digitalisdarreichung per os fast in allen Fällen das Wachsen der Amplitude dem Eintreten der Pulsverlangsamung entspricht. Nur in ganz vereinzelten Fällen sahen wir eine Vergrösserung der Amplitude bei gleichbleibender Pulsfrequenz. Das Umgekehrte kam ganz vereinzelt auch vor. Mehrfach sahen wir gute Diuresen bei unveränderter Amplitude.

Ich fasse die Resultate, die sich aus meinen Tabellen ergeben, kurz zusammen.

1. Unter 17 Mitralinsuffizienzen in verschiedenen schweren Dekompensationsstadien reagierten 15 prompt. Die zwei anderen waren eine chronische Herzinsuffizienz und ein kaum dekompensiertes Vitium.

Die Dosierung bewegte sich in weiten Grenzen; 0,5 Infus resp. 0,3—0,4 pulvis oder Digipuratum waren für die ersten Tage das gewöhnliche. In toto wurde bis 3 g Infus und 2,2 g pulvis gegeben. — Wir bemerken, dass der Titer unserer

Odenwalddigitalis, den Herr Geheimrat Gottlieb selbst zu bestimmen die Güte hatte, dem des Digipuratum etwa gleich steht (80 Froscheinheiten für 1,0 g Digitalispulver).

Eine Diuresenschädigung trat nie ein.

2. Von 4 reinen Mitralstenosen reagierten zwei nicht. Die eine mit rein hepatischer Stauung verhielt sich ganz refraktär. Die andere (starke Dilatation nach rechts, Lungeninfarkte) antwortete nur mit Pulsverlangsamung.

Gegeben wurde  $2-4 \times 0,1$  pulv. oder Digipur. p. d. bis 2,8 in 10 Tagen.

Keine Diuresenverschlechterung.

3. Unter 31 Patienten mit Mitralinsuffizienz und -stenose waren nur zwei, die nicht reagierten: Einer, bei dem gleichzeitig eine schwere Myokarditis bestand, und einer mit kompensiertem Vitium und davon unabhängiger Bronchitis.

Die Dosierung war im allgemeinen gleichmässig. In den ersten Tagen 0,5 Infus resp. 0,3 Digipur. Als Gesamtmengen wurden 1,5 g Digipur. nicht überschritten. Infus wurde bis zu 3,5 g gegeben.

Die Diurese blieb stets gut.

4. Von 9 Aorteninsuffizienzen versagten zwei. Das eine war eine schwere Dekompensation mit einer Dilatation des Herzens nach links von 17 cm, das andere ein älterer Patient mit chronischer Zystitis in schlechtem Allgemeinzustand.

Gegeben wurde 0,4—0,5 g Infus p. d. bis 3,6 g. in toto resp. 0,2—0,4 g Digipur. bis 2,5 in toto.

Bei dieser Dosierung ging die Pulsfrequenz nur 3 mal bis ca. 70 herunter, blieb sonst immer um 80 in der Minute.

Diuresenverschlechterung sahen wir nie.

5. Vier Trikuspidalinsuffizienzen, darunter drei mit Mitralfehlern kombiniert, wurden mit Digitalis behandelt. In allen Fällen fand sich eine Dilatation des Herzens nach rechts und links und Stauungsleber. Eine weitgehende Besserung sahen wir bei keinem Patienten. Einmal kam auf Theocin eine gute Diurese zustande, einmal wirkte Digitalis befriedigend (Einfuhr 1800 — Ausfuhr 1500).

Dosierung: 0,2 Digip. und 0,3 Infus p. d., in toto bis 1,2 Digip. und 2,2 g Infus.

6. Nicht so einheitlich waren die Resultate bei 30 kombinierten Aorten- und Mitralfehlern. 9 reagierten überhaupt nicht und zwar ein Fall mit begleitender schwerer Myokarditis, 2 Vitien ohne Stauungserscheinungen, 6 mit vorwiegend hepatischer Stauung.

Dosierung: 0,2—0,4 g pulv. oder Digipur., 0,3—0,6 g Infus, in toto bis 2,5 g pulv. und 3,8 g Infus.

7. Von 33 Herzmuskelerkrankungen ohne begleitende Atherosklerose stellten die chronischen Myokarditiden das grösste Kontingent. Die übrigen setzten sich aus 5 akuten Myokarditiden und 4 Kropfherzen zusammen. Von allen haben nur 5 nicht reagiert, darunter 2 Kropfherzen ohne Stauungen, eine Diphtheriemyokarditis, zwei chronische Myokarditiden mit starker hepatischer Stauung.

Diuresenverschlechterung wurde nie bemerkt.

Die Medikation war verschieden, teils auf wenige Tage beschränkt bei einer Dosierung von 0,2—0,4 g pulv. oder Digipur. resp. 0,3—0,5 g Infus p. d. — teils wurde die Digitalis chronisch gegeben. Die Dosen waren in diesen Fällen anfangs die gleichen, wie oben genannt, wurden dann herabgesetzt bis auf 0,05 oder 0,1 pulv. oder Digipur. p. d.

8. Die Myokarditiden, bei denen sich gleichzeitig Atherosklerose fand, sei es nun, dass diese zu der Myokarditis hinzugekommen war, oder ätiologische Grundlage für letztere bildete — verhielten sich anders. Von 63 reagierten 8 überhaupt nicht. Dies waren teils alte Herzen mit schweren Dekompensationserscheinungen, teils solche mit hepatischer Stauung. In 39 Fällen trat eine eklatante Diurese ein. 9 mal sahen wir eine plötzliche Diuresenverschlechterung bei einer Dosierung von 0,4—0,5 g Infus resp. 0,2—0,4 g Digipur. p. d., sonst war die Dosierung sehr verschieden: 0,1—0,4 g Digipur. und 0,2—0,5 g Infus. Ebenso schwankte die Gesamtmenge.

9. Bei 5 exsudativen Perikarditiden wurde Digitalis gegeben. Bei allen fand sich vorwiegend hepatische Stauung. Ausser Pulsverlangsamung in zwei Fällen trat niemals eine deutliche Wirkung ein.

Dosierung: 0,2—0,3 g pulv. Grösste Dosis 4,5 g pulv. in 24 Tagen.

10. Zehn sekundäre Herzinsuffizienzen infolge von Lungen- oder Pleuraerkrankungen wurden mit Digitalis behandelt. Sie reagierten alle nicht mit Ausnahme einer relativen Mitralsuffizienz bei Pleuraschrumpfung mit Dekompensation.

11. Von 21 Fällen von Herzinsuffizienz bei Nephritis ohne nachweisbare Atherosklerose, bei denen sich überall eine Hypertonie fand, reagierte eine mit hepatischer Stauung nicht.

In zwei Fällen trat Diuresenverschlechterung ein. Beide Male handelte es sich um komplizierende Pleuritiden, sonst reagierten alle glänzend.

Dosis: Infus 0,3—0,5 g p. d., in toto bis 3,8 g, Digipur. 0,2 bis 0,4 g p. d., in toto bis 2,1 g.

12. 13 mal wurde bei Nephritis mit Atherosklerose Digitalis gegeben. Nur in 7 Fällen trat eine befriedigende Diurese ein, bei den übrigen blieb sie aus. In einem Fall verschlechterte sich die Diurese, nachdem sie gestiegen war, bei 0,5 g Infus p. d.

Dosis: Infus 0,3—0,5 g p. d. bis 3 g in toto, Pulv. und Digipur. 0,3—0,4 g p. d. bis 2,9 g in toto.

Schlechte Reaktion sahen wir zunächst in den Fällen, bei denen uns alle Momente berechtigen, einen schlechten Zustand des Herzmuskels anzunehmen. Ferner aber bei vorwiegend einseitiger Kammerschwäche, z. B. wie es schon Leyden hervorgehoben hat, bei der Insuffizienz des rechten Herzens infolge von Lungenerkrankungen.

In vielen Fällen von hepatischer Stauung erscheint die Digitalis wirkungslos.

Bei Atherosklerotikern ist die Diurese gefährdet, falls man grosse Dosen gibt, und namentlich mit grösseren Gaben längere Zeit fortfährt. Es bedarf bei ihnen einer besonders vorsichtigen Digitalisdarreichung, weil sonst sehr leicht sogar eine Verschlechterung der Diurese eintritt.

#### Literatur.

1. Fränkel: Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde, 1. — 2. Fränkel und Schwartz: Ueber intravenöse Strophanthininjektionen. Archiv f. exp. Pathol. u. Ther., 57. — 3. Münch. med. Wochenschr. 1912, 6/7. — 4. Feilner: Wahre Pulsgrösse bei Herzkrankheiten. Archiv f. klin. Med., 88. — 5. Gottlieb: Ueber Digitaliswirkung. Kongress f. innere Med. (Sahli), 1901. — 6. Gottlieb und Magnus: Archiv f. exp. Pathol. u. Ther., 47. — 7. Gottlieb und Meyer: Experimentelle Pharmakologie. — 8. Hoepffner: Archiv f. klin. Med. 1908. — 9. Krühl: Pathologische Physiologie. — 10. Derselbe: Herzkrankheiten. — 11. Leyden: Wirkungsweise und Indikationen der Digitalis. Deutsche med. Wochenschr. 1881, 25/26. — 12. Lust: Archiv f. klin. Med. 1907. — 13. Romberg: Herzkrankheiten, 2. Aufl. — 14. Schmiedeberg: Beitr. z. Kenntn. d. pharm. Gruppe d. Digitalis. Archiv f. exp. Pathol. u. Pharm., 16.

| No. | Diagnose                                                                            | Folge-<br>erscheinungen                                                                | Herzgrenzen                                                    | Therapie                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | G. J. Fr., 55 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Myokarditis                               | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas<br>Dyspnoe                                    | Dilatation<br>n. l. u. r.                                      | Pulv. fol. dig.<br>0,4 p. d.<br>1,5 g in 4 T.                                                  |
| 2   | J. S. 25 J.<br>Mitralinsuffizienz                                                   | Dyspnoe<br>geringe Leber-<br>schwellung                                                | Geringe<br>Dilatation<br>n. links                              | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 6 T.                                                               |
| 3   | J. G. 25 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Nephritis chron.<br>Insuffic. cordis<br>gravis | Starke Oedeme<br>Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Nach 3 Wochen<br>Verschlechte-<br>rung | Dilat. nach<br>l. u. r.                                        | Digalen<br>5 ccm p. d.<br>i. t. 18 ccm<br><br>Infus. 1,0 : 200,0<br>0,5 p. d.<br>2,5 g in 5 T. |
| 4   | K. H. 54 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Myocarditis chron.<br>Decompensatio<br>gravis  | Starke allgem.<br>Stauungen<br>leichte Irregu-<br>larität                              | 4 : 15                                                         | Digipur. 0,4 p. d.<br>4,0 g in 8 T.                                                            |
| 5   | J. P. 48 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Insuffic. cordis<br>gravis                     | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularität                                               | 6 : 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                             | Infus. 1,0 : 150,0<br>0,6 p. d. dann<br>weniger<br>2,2 g in 5 T.                               |
| 6   | O. E. 34 J.<br>Mitralinsuffizienz                                                   | Oedeme<br>Spur Albumen                                                                 | 6 : 14                                                         | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,1 g in 4 T.                                                            |
| 7   | A. L. 45 J.<br>Mitralinsuffizienz                                                   | Cyanose, Leber-<br>schwellung<br>Irregularitas<br>Spur Albumen                         | 5 : 15                                                         | Infus. 1,0 : 150,0<br>0,5 p. d.<br>3,0 g in 7 T.<br>dann Pulv. 0,1 p. d.<br>0,8 in 8 T.        |
| 8   | P. R. 16 J.<br>Mitralinsuffizienz                                                   | Dyspnoe, Leber-<br>schwellung<br>Spur Albumen                                          | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> : 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Infus. 0,5 : 75,0<br>p. d.<br>2,5 g in 5 T.                                                    |
| 9   | E. S. 46 J.<br>Mitralinsuffizienz                                                   | Leicht. Knöchel-<br>ödem, sonst<br>keine Stauungen                                     | 3,5 : 10                                                       | Infus. 1,0 : 150,0<br>0,4 p. d.<br>2,4 g in 7 T.                                               |

insuffizienz

| Pulsfrequenz                                     | Diurese                                                        | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. T. 136<br>4. T. 92<br>bleibt                  | 1. T. 400<br>4. T. 2300<br>5. T. 6600<br>bleibt gut            | —                               | Stauungen ver-<br>schwinden<br>Irregularität<br>bleibt |
| 1. T. 80<br>4. T. 72<br>5. T. 80                 | 1. T. 300<br>3. T. 500<br>5. T. 1500                           | —                               | Völlige<br>Kompensation                                |
| 1. T. 122<br>3. T. 96<br>7. T. 60                | 1. T. 500<br>3. T. 1400<br>7. T. 2700                          | Erbrechen                       | Etwas<br>Besserung                                     |
| 1. T. 102<br>4. T. 96<br>6. T. 54                | 2. T. 1500<br>4. T. 2300<br>6. T. 1500<br>bleibt gut           | Bradykardie                     | Besserung                                              |
| 1. T. 104<br>3. T. 96<br>6. T. 78                | 1. T. 400<br>3. T. 700<br>6. T. 1600<br>8. T. 2600             | —                               | Weitgehende<br>Besserung                               |
| 1. T. 78<br>3. T. 66<br>4. T. 52                 | 1. T. —<br>2. T. 600<br>3. T. 1200<br>4. T. 3000<br>bleibt gut | Flimmern<br>Uebelkeit           | Besserung,<br>Irregularität<br>besteht fort.           |
| 1. T. 66<br>3. T. 72<br>5. T. 72                 | 1. T. 1100<br>3. T. 1000<br>5. T. 1180                         | —                               | Etwas<br>Besserung                                     |
| 1. T. 76<br>3. T. 48<br>5. T. 56<br>bleibt um 60 | 2. T. 750<br>3. T. 2100<br>4. T. 1600<br>bleibt gut            | —                               | Kompensation                                           |
| 1. T. 70<br>3. T. 60<br>4. T. 52                 | 1. T. 800<br>3. T. 2000<br>4. T. 1900                          | —                               | Kompensation                                           |
| 1. T. 72<br>3. T. 84<br>5. T. 60                 | 1. T. 800<br>3. T. 500<br>(Einfuhr 1000)                       | —                               | Keine<br>Aenderung                                     |

| No.     | Diagnose                                                                  | Folge-<br>erscheinungen                      | Herzgrenzen               | Therapie                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | C. L. 59 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Arteriosklerose<br>Herzinsuffizienz  | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas     | 6:11                      | Infus. 0,4 p. d.<br>dann weniger<br>1,5 g in 7 T.                               |
| 11      | O. M. 32 J.<br>Mitralinsuffizienz                                         | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas     | 5:13                      | Infus. 1,5:300<br>0,5 p. d.<br>2,5 g in 5 T.                                    |
| 12      | A. Q. 13 J.<br>Endocarditis<br>mitralis                                   | Bronchitis                                   | 4,5:10                    | Infus. 1,0:150<br>0,3 p. d. dann<br>weniger<br>1,3 g in 6 T.                    |
| 13      | M. P. 55 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Nephritis chron.<br>Insuffic. cordis | Starke allgem.<br>Stauungen<br>Irregularitas | 5:16                      | Infus. 1,0:150<br>Zunächst<br>0,4—0,6 p. d.<br>dann 0,2 p. d.<br>6,1 g in 25 T. |
| 14      | K. M. 25 J.<br>Mitralinsuffizienz                                         | Allgemeine<br>Stauungen                      | 3:11                      | Infus. 0,2 p. d.<br>2,2 g in 11 T.                                              |
| 15      | H. B. 38 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Nephritis chron.                     | Oedeme, Leber-<br>schwellung<br>Ascites      | 4:10                      | Infus. 0,5 p. d.<br>1,8 g in 4 T.                                               |
| 16      | O. L. 33 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Tuberc. pulm.<br>levis               | Cyanose<br>keine wesentl.<br>Stauungen       | 4:14,5                    | Infus. zuerst<br>0,5 p. d.<br>2,4 g in 7 T.                                     |
| 17      | M. J. 26 J.<br>Mitralinsuffizienz                                         | Leberschwell.<br>Spur Albumen                | 4:10                      | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,1 g in 4 T.                                             |
| Mitral- |                                                                           |                                              |                           |                                                                                 |
| 18      | M. L. 42 J.<br>Mitralstenose                                              | Tachykardie<br>Cyanose                       | Dilatation<br>n. r. u. l. | Digipur. 0,4 p. d.<br>1,2 g in 3 T.                                             |

| Pulsfrequenz                                    | Diurese                                                     | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 78<br>3. T. 60<br>5. T. 68                | 1. T. 700<br>2. T. 2000<br>4. T. 4200<br>bleibt gut         | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                                      |
| 1. T. 72<br>2. T. 58<br>4 T. 52                 | 1. T. 1500<br>2. T. 2400<br>4. T. 1500                      | Erbrechen<br>Uebelkeit          | Besserung,<br>Irregularität<br>besteht                                                        |
| 1. T. 116<br>3. T. 104<br>6. T. 100<br>7. T. 96 | 1. T. 1700<br>2. T. 2100<br>5. T. 1500<br>bleibt gut        | —                               | Besserung                                                                                     |
| 1. T. 92<br>3. T. 76<br>5. T. 72<br>bleibt so   | —<br>3. T. 1400<br>5. T. 2000<br>6. T. 2400                 | —                               | Besserung                                                                                     |
| 1. T. 84<br>3. T. 72<br>5. T. 78                | 1. T. 1220<br>2. T. 1100<br>3. T. 1500<br>Einfuhr 1500      | —                               | Kompensation                                                                                  |
| 1. T. 100<br>3 T. 92<br>5. T. 80                | 1. T. 800<br>2. T. 2000<br>3. T. 1400                       | Erbrechen                       | Weitgehende<br>Besserung                                                                      |
| 1. T. 64<br>3. T. 62<br>5. T. 48                | 1. T. 1100<br>3. T. 2100<br>6. T. 1950                      | —                               | Kompensation                                                                                  |
| 1. T. 76<br>3. T. 84<br>4. T. 64                | 1. T. 700<br>3. T. 950<br>4. T. 1520<br>bleibt gut          | —                               | Kompensation                                                                                  |
| <b>stenose.</b>                                 |                                                             |                                 |                                                                                               |
| 1. T. 102<br>2. T. 90<br>3. T. 84<br>5. T. 72   | 1. T. 1200<br>3. T. 1500<br>4. T. 1000<br>bleibt ordentlich | Erbrechen<br>Uebelkeit          | Etwas<br>Besserung, nach<br>3 Wochen Pulv.<br>0,3 p. d. 0,9 i. t.<br>mit demselben<br>Erfolg. |

| No. | Diagnose                                                      | Folge-<br>erscheinungen                              | Herzgrenzen                       | Therapie                           |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 19  | K. Z. 40 J.<br>Mitralstenose<br>Myocard. chron.               | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas             | Dilatation<br>n. r. u. l.         | Digip. 0,3 p. d.<br>2,8 g in 10 T. |
| 20  | M. G.<br>Mitralstenose<br>Cholecystitis                       | Dyspnoe<br>Cyanose<br>Leberschwell.<br>Irregularität | Geringe<br>Dilatation<br>r. u. l. | Infus. 0,2 p. d.<br>0,9 g in 5 T.  |
| 21  | D. H. 25 J.<br>Mitralstenose<br>Myokarditis<br>Lungeninfarkt. | Leberschwell.<br>Spur Albumen<br>Irregularitas       | 7:13                              | Digip. 0,2 p. d.<br>1,2 g in 6 T.  |

Mitralinsuffizienz

|    |                                                                                           |                                                    |                           |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 22 | M. K. 36 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                                          | Oedeme<br>Arrhythmie                               | Dilatation<br>n. r. u. l. | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,7 g in 6 T.                                  |
| 23 | C. K. 28 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Myocarditis gravis                    | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas           | Dilatation<br>n. l. u. r. | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                                  |
| 24 | K. K. 30 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Insuffic. cord. gravis                | Allgemeine<br>Stauungen                            | 6:15                      | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                               |
| 25 | M. M. 57 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Myocardit. chron.<br>Nephritis chron. | Dyspnoe, leichte<br>Leberschwell.<br>Irregularität | Dilatation<br>n. l. u. r. | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 4 T.                                  |
| 26 | J. R. 35 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                                          | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularität           | 5:13                      | Pulv. 0,3, dann<br>ganz kleine Dos.<br>1,58 g in fast<br>4 Wochen |

| Pulsfrequenz                                               | Diurese                                                           | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. T. 114<br>3. T. 102<br>4. T. 84<br>6. T. 66<br>9. T. 48 | 1. T. 600<br>3. T. 1400<br>4. T. 1400<br>6. T. 2800<br>7. T. 3000 | Kopfschmerzen<br>Flimmern       | Beschwerdefrei<br>entlassen                         |
| 1. T. 88<br>3. T. 68<br>4. T. 90                           | 1. T. 800<br>3. T. 830<br>4. T. 900                               | —                               | Keine<br>Aenderung                                  |
| 1. T. 92<br>3. T. 80<br>5. T. 68                           | 1. T. 700<br>3. T. 1000<br>4. T. 900                              | Erbrechen                       | Keine<br>Aenderung<br>ausser Pulsver-<br>langsamung |

und -stenose.

|                                                |                                                    |                               |                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 123<br>3. T. 100<br>5. T. 84             | 1. T. 850<br>3. T. 1000<br>4. T. 1300              | Appetitlosigkeit<br>Erbrechen | Kompensation                                                                               |
| 1. T. 96<br>3. T. 90<br>5. T. 76               | 1. T. 700<br>3. T. 1200<br>5. T. 800               | —                             | Ausser Pulsver-<br>langsamung<br>keine Aender.,<br>später Digalen<br>ebenso ohne<br>Erfolg |
| 1. T. 78<br>3. T. 54<br>5. T. 72               | 1. T. 1400<br>3. T. 2000<br>5. T. 2200             | —                             | Besserung,<br>10 Tage vorher<br>Digalen ohne<br>wesentl. Erfolg                            |
| 1. T. 110<br>2. T. 105<br>4. T. 80<br>5. T. 72 | 1. T. 700<br>3. T. 1200<br>5. T. 1700              | Flimmern                      | Subjektiv<br>Wohlbefinden                                                                  |
| 1. T. 66<br>3. T. 58<br>5. T. 72<br>wechselnd  | 1. T. 500<br>3. T. 900<br>4. T. 2100<br>5. T. 1400 | Erbrechen                     | Kompensation,<br>nach 3 Monaten<br>Status idem,<br>gleiche Reaktion                        |

| No. | Diagnose                                                                      | Folge-<br>erscheinungen                  | Herzgrenzen               | Therapie                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 27  | K. D. 32 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                              | Allgemeine<br>Stauungen                  | Dilatation<br>n. r. u. l. | Infus. 1,0 : 200,0<br>4,0 g in 11 T.             |
| 28  | L. H. 30 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Decompensatio<br>gravis   | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas | 4,5 : 13                  | Digipur. 0,4 p. d.<br>1,2 g in 4 T.              |
| 29  | N. K. 41 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                              | Allgemeine<br>Stauungen                  | 8 : 16                    | Digipur. 0,4 p. d.<br>1,7 g in 5 T.              |
|     |                                                                               | Nach 3 Wochen<br>Status idem             |                           | Infus. 0,5 : 75,0<br>0,5 p. d.<br>3,5 g in 8 T.  |
| 30  | L. N. 31 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Myokarditis               | Dyspnoe<br>Irregularitas                 | 4 : 12                    | Infus. 1,0 : 150,0<br>0,6 p. d.<br>2,0 g in 4 T. |
|     |                                                                               | Nach 2 Monaten<br>Oedeme                 | 4,5 : 13                  | Pulv. 0,2 p. d.<br>2,6 g in 14 T.                |
| 31  | A. W. 30 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                              | Allgemeine<br>Stauungen                  | 4,5 : 14,5                | Infus. 0,5 : 75,0<br>0,5 p. d.<br>2,1 g in 5 T.  |
| 32  | E. B. 26 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Bronchitis                | Keine<br>Stauungen                       | 3 : 11,5                  | Infus. 0,5 : 75,0<br>0,4 p. d.<br>1,2 g in 4 T.  |
| 33  | L. F. 30 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Gravidität im<br>IX. Mon. | Allgemeine<br>Stauungen                  | 6 : 8,5                   | Infus. 0,3 p. d.<br>2,0 g in 7 T.                |
| 34  | A. H. 16 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                              | Leberschwell.<br>Dyspnoe                 | 4,5 : 1.<br>Axillarlinie  | Infus. 0,3 p. d.<br>2,7 g in 9 T.                |

| Pulsfrequenz                                                   | Diurese                                                   | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 132<br>4. T. 120<br>7. T. 72                             | 2. T. 1600<br>3. T. 2400<br>6. T. 1500<br>bleibt          | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                                               |
| 1. T. 96<br>2. T. 86<br>4. T. 80<br>5. T. 100                  | 1. T. 800<br>3. T. 3700<br>4. T. 5000<br>5. T. 3800       | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                                               |
| um 80<br>unverändert                                           | 2. T. 500<br>5. T. 1900<br>6. T. 2400                     | —                               | Oedeme schwin-<br>den vollständig;<br>nach Absetzen<br>d. Dig. schlechte<br>Diurese                    |
| 1. T. 78<br>2. T. 72<br>4. T. 60                               | 1. T. 550<br>4. T. 900<br>5. T. 1600                      | —                               | Besserung                                                                                              |
| 1. T. 96<br>2. T. 82<br>3. T. 70                               | 1. T. 700<br>2. T. 1000<br>3. T. 1200                     | —                               | Wohlbefinden                                                                                           |
| 1. T. 144<br>2. T. 108<br>3. T. 90<br>4. T. 72<br>6. T. 54     | 2. T. 1700<br>3. T. 2300<br>4. T. 3000<br>5. T. 3400      | Flimmern                        | Sehr gebessert                                                                                         |
| 1. T. 200<br>2. T. 180<br>(abends 108)<br>3. T. 88<br>4. T. 72 | 2. T. 1200<br>3. T. 4200<br>4. T. 3200<br>bleibt sehr gut | Flimmern<br>Breachreiz          | Wesentliche<br>Besserung<br>5 Tage später<br>stärk. Irregulari-<br>tät, die auf 1,3 g<br>Pulv. abnimmt |
| 1. T. 84<br>4. T. 96<br>5. T. 72                               | 1. T. 1400<br>2. T. 1200<br>4. T. 1000                    | Uebelkeit                       | Kein. Aenderung<br>Bronchitis<br>keine Stauungs-<br>Bronchitis                                         |
| 1. T. 88<br>2. T. 82<br>4. T. 84<br>bleibt um 80               | 1. T. 1400<br>2. T. 1800<br>4. T. 1600<br>bleibt          | —                               | Besserung<br>am 1. T.<br>Stroph. intrav.                                                               |
| bleibt um 120                                                  | 1. T. 1200<br>3. T. 1400<br>7. T. 800<br>8. T. 1400       | Erbrechen                       | Keine deutliche<br>Wirkung ausser<br>guter Diurese                                                     |

| No. | Diagnose                                                                                    | Folge-<br>erscheinungen                           | Herzgrenzen | Therapie                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 35  | J. W. 20 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Peritonitis<br>Tuberkulosa                | Tachykardie<br>Bronchitis<br>Leberschwell.        | 4 : 10      | Infus. 0,5:75 p.d.<br>3,0 g in 6 T.                                  |
| 36  | R. K. 32 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Herzinsuffizienz                          | Bronchitis<br>Leberschwell.                       | 3,5 : 11,5  | Infus. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                                    |
| 37  | J. K. 25 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                                              | Leber- u. Milz-<br>schwellung<br>Irregularitas    | 6 : 13      | Infus. 0,4 p. d.<br>1,6 g in 5 T.                                    |
| 38  | A. K. 16 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                                              | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Cyanose<br>Dyspnoe | 5 : 9       | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 7 T.                                  |
| 39  | E. A. 30 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>leichte Dekom-<br>pensation               | Geringe<br>Oedeme,<br>Spur Albumen                | 3,5 : 11,5  | Infus. 0,5 p. d.<br>2,5 g in 7 T.<br>dann Pulv. 0,1<br>0,5 g in 4 T. |
| 40  | L. G. 23 J.<br>Endocarditis<br>recurrens<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Perikarditis | Keine<br>Stauungen                                | 3,5 : 9,5   | Infus. 0,4 p. d.<br>1,8 g in 5 T.                                    |
| 41  | L. H. 19 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                                              | Dyspnoe<br>Leberschwell.                          | 4,5 : 11    | Infus. 0,5 p. d.<br>1,5 g in 4 T.                                    |
| 42  | H. B. 48 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Decompensatio<br>gravis                   | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularität          | 4 : 10      | Infus. 0,5 p. d.<br>1,6 g in 4 T.                                    |
| 43  | E. H. 42 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Myokarditis                               | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas          | 3,5 : 12    | Infus. 0,5 p. d.<br>2,3 g in 6 T.                                    |
|     |                                                                                             | später<br>Status idem                             | 5 : 12      | Infus. 0,4 p. d.<br>3,0 g in 11 T.                                   |

| Pulsfrequenz                                    | Diurese                                                              | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 138<br>3. T. 134<br>6. T. 120             | 1. T. 1200<br>2. T. 1700<br>4. T. 1600<br>6. T. 1200                 | —                               | Gute Diurese<br>keine Puls-<br>verlangsamung                       |
| 1. T. 76<br>2. T. 82<br>4. T. 78<br>5. T. 72    | 1. T. 3200<br>2. T. 2400<br>4. T. 1400<br>bleibt gut                 | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                           |
| 1. T. 80<br>3. T. 70<br>4. T. 64<br>5. T. 52    | 1. T. 1400<br>3. T. 2300<br>5. T. 1400                               | Bradykardie                     | Kompensation                                                       |
| 1. T. 80<br>3. T. 72<br>4. T. 56                | 2. T. 500<br>4. T. 1800<br>6. T. 1500                                | —                               | Kompensation                                                       |
| um 90                                           | 1. T. 660<br>5. T. 1000<br>9. T. 1340<br>10. T. 1400<br>Einfuhr 1250 | —                               | Besserung                                                          |
| 1. T. 84<br>4. T. 82<br>5. T. 60                | 2. T. 600<br>3. T. 1400<br>6. T. 2100<br>Einfuhr 800—1100            | —                               | Wohlbefinden                                                       |
| 1. T. 74<br>2. T. 72<br>3. T. 54                | 1. T. 1300<br>4. T. 1200<br>Einfuhr 800—1200                         | Bradykardie<br>Erbrechen        | Besserung                                                          |
| 1. T. 100<br>3. T. 72<br>5. T. 52               | 1. T. 1150<br>2. T. 2000<br>4. T. 1800<br>Einfuhr 1250               | Bradykardie                     | Weitgehende<br>Besserung<br>Irregularität<br>bleibt                |
| 1. T. 70<br>3. T. 80<br>5. T. 68<br>6. T. 58    | 1. T. 1700<br>3. T. 3500<br>4. T. 3000<br>Einfuhr 1000               | —                               | Stauungs-<br>erscheinungen<br>aufgehoben                           |
| 1. T. 154<br>3. T. 120<br>5. T. 88<br>7. T. 100 | 1. T. 1200<br>3. T. 1400<br>5. T. 2250<br>Einfuhr 1250               | —                               | Oedeme gehen<br>zurück; Allge-<br>meinzustand<br>nicht befriedigt. |

| No. | Diagnose                                                             | Folge-<br>erscheinungen                                  | Herzgrenzen                  | Therapie                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 44  | M. H. 55 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                       | Bronchitis,<br>Leberschwell.<br>Albumen<br>Irregularitas | 4,5: vordere<br>Axillarlinie | Infus. 0,3 p. d.<br>2,1 g in 7 T.                    |
| 45  | E. S. 38 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Insuffic. cordis   | Bronchitis<br>Ascites                                    | 6: 12                        | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 5 T.                  |
| 46  | A. S. 26 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                       | Allgem. starke<br>Stauungen<br>Irregularität             | 4,5: 12,5                    | Eulv. 0,3 p. d.<br>0,5 g in 2 T.                     |
| 47  | E. J. 22 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. stenose                        | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularität                 | 3: 10                        | Infus. 0,5 p. d.<br>2,9 g in 7 T.                    |
|     |                                                                      | später<br>Status idem                                    | 4: 15                        | Infus. 0,5 p. d.<br>2,9 g in 8 T.                    |
| 48  | M. S. 46 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                       | Starke allgem.<br>Stauungen                              | 4,5: 14                      | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,0 g in 4 T.                  |
| 49  | P. W. 28 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Myocarditis chron. | Leberschwell.<br>Irregularitas                           | 5: 12                        | Infus. 0,3 p. d.<br>3,5 g in 13 T.                   |
| 50  | E. H. 17 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose<br>Insuffic. cordis   | Allgemeine<br>Stauungen                                  | 4,5: 12                      | Infus. 0,4 p. d.<br>3,0 g in 9 T.                    |
| 51  | G. R. 25 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                       | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Albumen<br>Irregularitas  | 5: 13                        | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 6 T.                  |
| 52  | B. S. 30 J.<br>Mitralsuffizienz<br>u. -stenose                       | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Cyanose                   | 5: 12                        | Digipur. 0,4 p. d.<br>dann weniger<br>2,4 g in 11 T. |

| Pulsfrequenz                                   | Diurese                                                     | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 102<br>3. T. 80<br>4. T. 60              | 1. T. 400<br>2. T. 1100<br>3. T. 3000<br>Einfuhr 1000—1200  | Erbrechen                       | Weitgehende<br>Besserung                                                                       |
| 1. T. 74<br>3. T. 62                           | 2. T. 2300<br>4. T. 1800<br>Einfuhr 1200—1400               | —                               | Besserung                                                                                      |
| 1. T. 80<br>2. T. 72<br>3. T. 60               | 2. T. 2050<br>4. T. 3400<br>Einfuhr 1100                    | —                               | Völlige<br>Kompensation                                                                        |
| 1. T. 82<br>3. T. 80<br>5. T. 76               | 1. T. 1360<br>2. T. 2300<br>3. T. 1800<br>Einfuhr 1500      | —                               | Besserung                                                                                      |
| schwankt                                       | 3. T. 1620<br>5. T. 3000<br>Einfuhr 1750                    | —                               | Besserung; nach<br>einigen Wochen<br>2,45 Inf. in 11 T.<br>mit gutem Erfolg                    |
| 1. T. 140<br>3. T. 80<br>5. T. 60              | 1. T. 800<br>2. T. 1540<br>3. T. 1700<br>Einfuhr 1250       | Erbrechen                       | Besserung                                                                                      |
| 1. T. 72<br>3. T. 78<br>4. T. 64<br>5. T. 84   | 1. T. 900<br>3. T. 1000<br>4. T. 1300<br>Einfuhr 1500       | —                               | Besserung<br>Irregularität<br>bleibt                                                           |
| 1. T. 100<br>4. T. 112<br>6. T. 98<br>7. T. 90 | 1. T. 1700<br>3. T. 3100<br>5. T. 4000<br>Einfuhr 1250—1500 | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                                       |
| 1. T. 84<br>2. T. 80<br>4. T. 72               | 1. T. 600<br>3. T. 1300<br>4. T. 1600<br>Einfuhr 1500—1750  | —                               | Besserung; nach<br>4 Woch. Dekompensation; auf<br>1,7 g Digipur. in<br>8 T. gleich. Erfolg     |
| schwankt<br>zwischen 70 u. 90                  | 1. T. 1100<br>3. T. 1500<br>5. T. 1370<br>Einfuhr 1500      | —                               | Besserung.<br>Nach 4 Wochen<br>Dekompensat.<br>Auf Infus. 3,1 g in<br>12 T. gleiche<br>Wirkung |

| No. | Diagnose                                                                                   | Folge-<br>erscheinungen                                                    | Herzgrenzen | Therapie                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 53  | H. F. 60 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>Tabes dorsalis                                        | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularität                                   | 4,5 : 11    | Infus. 0,4 p. d.<br>1,6 g in 5 T.       |
| 54  | J. H. 49 J.<br>Insuffiz., Aortae<br>et cordis gravis<br>Dilatatio Aortae<br>Tabes dorsalis | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Milztumor<br>Spur Albumen,<br>Irregularitas | 5,5 : 17    | Infus. 0,4 p. d.<br>2,0 g in 5 T.       |
| 55  | J. F. 46 J.<br>Insuffiz. Aortae<br>Emphyseem<br>Bronchitis<br>Tabes dorsalis               | Allgemeine<br>Stauungen                                                    | 6,5 : 13    | Infus. 0,4 p. d.<br>3,6 g in 10 T.      |
| 56  | A. Z. 18 J.<br>Polyarthriti<br>rheumatica<br>Aorteninsuffizienz                            | Irregularitas<br>Keine<br>Stauungen                                        | 4 : 9       | Infus. 0,5 p. d.<br>2,1 g in 7 T.       |
| 57  | E. E. 58 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>Cystitis chronica                                     | Oedeme, Album.<br>Herzklopfen<br>Schwindel                                 | 5,5 : 10    | Infus. 0,5 p. d.<br>2,0 g in 5 T.       |
| 58  | G. H. 39 J.<br>Aneurysma Aortae<br>Nephritis                                               | Allgemeine<br>Stauungen                                                    | 6 : 13,5    | Digip. 0,2 p. d.<br>2,5 g in 15 T.      |
| 59  | M. E. 26 J.<br>Aorteninsuffizienz                                                          | Leberschwell.<br>Spur Albumen                                              | 3,5 : 11,5  | Digip. 0,3 p. d.<br>1,8 g in 8 T.       |
| 60  | O. K. 36 J.<br>Aortitis luetica<br>Aorteninsuffizienz                                      | Leberschwell.<br>Spur Albumen<br>Extrazystalen                             | 4 : 12      | Digip. 0,4 p. d.<br>1,8 g in 5 T.       |
| 61  | J. D. 44 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>Nephritis chron.                                      | Herz- u. Atem-<br>beschwerden                                              | 4 : 14,5    | Digalen<br>2,25 ccm p. d.<br>15 T. lang |

insuffizienz

| Pulsfrequenz                                  | Diurese                                                     | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. T. 120<br>3. T. 96<br>5. T. 80             | 1. T. 500<br>3. T. 1400<br>5. T. 3400<br>Einfuhr 1250—1800  | —                               | Die Stauungen<br>schwinden<br>Irregularität<br>bleibt      |
| 1. T. 92<br>3. T. 72<br>5. T. 68<br>6. T. 76  | 2. T. 850<br>3. T. 1000<br>4. T. 800<br>Einfuhr 1250        | Uebelkeit,<br>Appetitlosigkeit  | Keine Wirkung                                              |
| 1. T. 112<br>4. T. 92<br>5. T. 88<br>7. T. 80 | 1. T. 600<br>3. T. 1000<br>5. T. 2500<br>Einfuhr 1500       | —                               | Besserung                                                  |
| 1. T. 100<br>3. T. 96<br>5. T. 88<br>6. T. 80 | 1. T. 1100<br>2. T. 1300<br>3. T. 1200<br>Einfuhr 1100—1250 | Geringe<br>Uebelkeit            | Besserung<br>Irregularität<br>schwindet                    |
| 1. T. 96<br>3. T. 92<br>4. T. 82              | 1. T. 600<br>3. T. 1000<br>4. T. 900<br>Einfuhr 1000—1600   | —                               | Keine Diuresen-<br>wirkung<br>subjektiv keine<br>Besserung |
| 1. T. 108<br>2. T. 90<br>4. T. 72             | 2. T. 1520<br>4. T. 1620<br>5. T. 1900                      | —                               | Kompensation                                               |
| 1. T. 78<br>3. T. 72<br>5. T. 78              | 1. T. 1200<br>3. T. 1600<br>5. T. 2000                      | —                               | Besserung                                                  |
| 1. T. 84<br>2. T. 78<br>4. T. 75<br>5. T. 85  | nicht gemessen                                              | —                               | Besserung                                                  |
| 1. T. 90<br>5. T. 72<br>10. T. 66             | 1. T. 1100<br>4. T. 1400<br>bleibt gut                      | —                               | Subjektiv<br>Besserung                                     |

Trikuspidal-

| No. | Diagnose                                                        | Folge-<br>erscheinungen                                           | Herzgrenzen | Therapie                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 62  | M. M. 26 J.<br>Trikuspidal- und<br>Mitralinsuffizienz           | Bronch., Leber-,<br>Milzschwell.<br>Spur Albumen<br>Irregularität | 7 : 14      | Digipur. 0,2 p. d.<br>1,2 g in 6 T.               |
| 63  | G. S. 63 J.<br>Trikuspidal-<br>insuffizienz<br>Insuffic. cordis | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen<br>Irregularität      | 5,5 : 12,5  | Infus. 0,6 p. d.<br>dann weniger<br>2,2 g in 8 T. |
| 64  | M. R. 27 J.<br>Trikuspidal- und<br>Mitralinsuffizienz           | Allgemeine<br>Stauungen                                           | 4,5 : 14    | Infus. 0,4 p. d.<br>dann weniger<br>2,2 g in 9 T. |
| 65  | E. W. 32 J.<br>Trikuspidal- und<br>Mitralinsuffizienz           | Leberschwell.<br>Albumen<br>Irregularitas                         | 4,5 : 12    | Infus. 0,3 p. d.<br>1,6 g in 6 T.                 |

Kombinierte Aorten-

|    |                                                                                    |                                                                       |                                     |                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 66 | A. S. 46 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose, Aorten-<br>insuffiz. u. -stenose | Starke allgem.<br>Stauungen                                           | Starke<br>Dilatation<br>n. r. u. l. | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                              |
| 67 | A. S. 23. J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz            | Leichte Leber-<br>schwell., Spur<br>Albumen, Dys-<br>pnoe, Herzklopf. | Starke<br>Dilatation<br>n. r. u. l. | Pulv. 0,2 p. d.<br>2,6 g in 13 T.<br>dann 0,1<br>33 Tage lang |
| 68 | J. A. 30 J.<br>Mitralstenose<br>(u. Insuffizienz?)<br>Aorteninsuffizienz           | Leichte Oedeme<br>Stauungsleber                                       | 5,5 : 14,5                          | Pulv. 0,4 p. d.<br>1,0 g in 3 T.                              |
| 69 | K. H. 11 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz             | Schmerzen in d.<br>Herzgegend<br>leichte<br>Irregularität             | 4 : 9                               | Pulv. 0,2 p. d.<br>0,5 g in 3 T.                              |
| 70 | K. H. 21 J.<br>Mitral- u. Aorten-<br>insuffizienz                                  | Herzklopfen                                                           | 3 : 13                              | Digalen 3 ccm<br>p. d.                                        |

insuffizienz

| Pulsfrequenz                                                | Diurese                                                               | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 88<br>3. T. 72<br>5. T. 80                            | 2. T. 740<br>4. T. 500<br>5. T. 500<br>Einfuhr 750                    | Uebelkeit<br>Bigeminie          | Keine<br>Aenderung                                               |
| 1. T. 150<br>3. T. 80<br>5. T. 140<br>6. T. 92<br>7. T. 130 | 1. T. 950<br>2. T. 1200<br>3. T. 800 etc.<br>bei Einfuhr<br>1500—2000 | —                               | Keine wesentl.<br>Besserung<br>auch mit Theocin<br>keine Diurese |
| 1. T. 132<br>3. T. 98<br>5. T. 76<br>6. T. 72               | 1. T. 400<br>3. T. 310<br>4. T. 400<br>Einfuhr 1500                   | Uebelkeit<br>Erbrechen          | Auf Theocin<br>Diurese                                           |
| 1. T. 96<br>3. T. 102<br>6. T. 106<br>8. T. 74              | 1. T. 1000<br>4. T. 1300<br>6. T. 1500<br>Einfuhr 1400—1800           | —                               | Etwas<br>Besserung.                                              |

und Mitralfehler.

|                                                                    |                                                        |                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. T. 84<br>3. T. 66<br>5. T. 60                                   | 1. T. 1600<br>3. T. 1400<br>5. T. 1000                 | Erbrechen<br>Flimmern   | Geringe<br>Besserung |
| 1. T. 102<br>3. T. 96<br>5. T. 84<br>bleibt zwischen<br>90 und 100 | 3. T. 2000<br>4. T. 2400<br>5. T. 1600<br>bleibt gut   | —                       | Besserung            |
| 1. T. 78<br>3. T. 70<br>4. T. 80                                   | 1. T. 1200<br>2. T. 1800<br>Einfuhr 1900—2200          | Uebelkeit<br>Breachreiz | Keine<br>Aenderung   |
| 1. T. 126<br>2. T. 106<br>4. T. 96                                 | 1. T. 540<br>3. T. 190<br>4. T. 320<br>Einfuhr 250—850 | Starkes<br>Erbrechen    | Keine<br>Aenderung   |
|                                                                    |                                                        | Bradykardie             |                      |

| No. | Diagnose                                                               | Folge-<br>erscheinungen                                                  | Herzgrenzen           | Therapie                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 71  | J. K. 55 J.<br>Mitral- u. Aorten-<br>insuffizienz<br>Koronarsklerose   | Spur Albumen<br>leichte Irregul.<br>Dyspnoe                              | 5,5 : 13              | Tinkt. Stroph.<br>9 T. 45 Tr. p. d.<br>dann<br>Digip. 0,3 p. d.<br>0,9 g in 3 T. |
| 72  | W. M. 38 J.<br>Mitralstenose u.<br>Aorteninsuffizienz                  | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Irregularitas                             | 5 : 12                | Pulv. 0,4 p. d.<br>2,5 g in 6 T.                                                 |
| 73  | K. S. 25 J.<br>Mitral- u. Aorten-<br>insuffizienz                      | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Irregularitas                             | 2 : 10                | Pulv. 0,4 p. d.<br>1,2 g in 3 T.                                                 |
| 74  | A. S. 25 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz | Dyspnoe<br>-                                                             | mässige<br>Dilatation | Digal. 3 × 15 Tr.<br>6 ccm in 8 T.                                               |
| 75  | M. V. 24 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz | Bronchitis<br>starke Leber-<br>schwellung<br>Spur Albumen                | 3 : 16                | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                                              |
| 76  | J. K. 28 J.<br>Mitral- u. Aorten-<br>insuffizienz                      | Bei Anstrengung<br>Herzklopf., sonst<br>keine Insuffiz-<br>erscheinungen | 6,5 : 13,5            | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 6 T.                                                |
| 77  | A. S. 37 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aortenstenose      | Bronchitis<br>Stauungsleber<br>Spur Albumen                              | 6 : 11                | Infus. 0,5 p. d.<br>3,75 g in 8 T.                                               |
| 78  | P. W. 22 J.<br>Mitral- u. Aorten-<br>insuffizienz                      | Herzklopfen<br>Kopfschmerz<br>keine Stauungen                            | 3,5 : 9,5             | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,8 g in 7 T.                                              |
| 79  | F. F. 29 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>u. -stenose<br>Mitralinsuffizienz | Starke allgem.<br>Stauungen                                              | 5,5 : 15              | Infus. 1. T. 1,0,<br>dann 0,5 p. d.<br>2,8 g in 5 T.                             |

| Pulsfrequenz                                                    | Diurese                                                                           | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 108<br>3. T. 94<br>4. T. 114<br>5. T. 82<br>bleibt um 100 | 1. T. 2000<br>5. T. 2500<br>9. T. 2100<br>Einfuhr 1600—2400<br>Diurese bleibt gut | —                               | Gute Diurese<br>sonst keine<br>Besserung                                                                                              |
| 1. T. 130<br>3. T. 88<br>5. T. 70                               | 1. T. 2000<br>2. T. 1900<br>4. T. 1500                                            | Brechreiz<br>Kopfweh            | Besserung                                                                                                                             |
| 1. T. 90<br>3. T. 84<br>4. T. 76                                | 1. T. 1800<br>3. T. 1600                                                          | —                               | Herzaktion<br>regulär                                                                                                                 |
| 1. T. 88<br>3. T. 76<br>5. T. 80<br>8. T. 100                   | 2. T. 1100<br>5. T. 1250<br>8. T. 1750                                            | —                               | Besserung, gute<br>Diurese; nach<br>3 Woch. Digipur.<br>1,5 g in 5 T.; nach<br>weiter. 3 Woch.<br>Infus. 1,5 g in 4 T.<br>ohne Erfolg |
| 1. T. 84<br>2. T. 72<br>3. T. 60                                | 4. T. 1250<br>5. T. 1050                                                          | Erbrechen                       | Keine Besserung                                                                                                                       |
| 1. T. 68<br>3. T. 66<br>5. T. 56                                | 1. T. 2000<br>2. T. 1600<br>5. T. 1500<br>Einfuhr 1600—2000                       | —                               | Subjektiv keine<br>Aenderung                                                                                                          |
| 1. T. 100<br>4. T. 80<br>6. T. 76<br>7. T. 72                   | 2. T. 800<br>3. T. 1200<br>4. T. 3500<br>5. T. 3000<br>Einfuhr 1300—1700          | —                               | Besserung                                                                                                                             |
| 1. T. 88<br>3. T. 96<br>4. T. 100<br>7. T. 76<br>8. T. 48       | 1. T. 1800<br>4. T. 2300<br>6. T. 2200<br>Einfuhr 1950—2100                       | Erbrechen<br>Bradykardie        | 3 Wochen<br>Wohlbefinden                                                                                                              |
| 1. T. 96<br>2. T. 80<br>4. T. 76<br>6. T. 72<br>7. T. 66        | 1. T. 600<br>3. T. 2900<br>4. T. 1800<br>7. T. 2000<br>Einfuhr 1200—1900          | —                               | Kompensation                                                                                                                          |

| Nr. | Diagnose                                                                                           | Folge-<br>erscheinungen                      | Herzgrenzen                | Therapie                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 80  | J. W. 53 J.<br>Vitium cordis<br>Kompos., Myokar-<br>ditis, Nephritis                               | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas     | 5:14                       | Infus. 0,5 p. d.<br>1,6 g in 4 T.                    |
| 81  | R. M. 26 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>u. -stenose, Mitral-<br>insuffizienz, chron.<br>Stauungsleber | Leber-, Milz-<br>schwellung<br>Albumen       | 6: vordere<br>Axillarlinie | Infus. 1. T. 0,7<br>dann weniger<br>3,4 g in 7 T.    |
| 82  | J. R. 27 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aortenstenose<br>Myokarditis                   | Bronchitis<br>Spur Albumen<br>Irregularitas  | 3:11,5                     | Infus. 0,5 p. d.<br>2,1 g in 5 T.                    |
| 83  | L. B. 33 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz                             | Leichte allgem.<br>Stauungen                 | 5:11                       | Infus. 0,3 p. d.<br>3,6 g in 12 T.                   |
| 84  | A. E. 12 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Aorteninsuffizienz<br>u. -stenose                             | Leber-, Milz-<br>schwellung                  | 3,5:7,5                    | Infus. 0,2 p. d.<br>2,0 g in 11 T.                   |
| 85  | L. F. 23 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz                             | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Albumen       | 4:12                       | Infus. 0,5 p. d.<br>dann weniger<br>2,7 g in 8 T.    |
| 86  | F. N. 12 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz<br>Edocarditis septica      | Tachycardie<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen | 4:12,5                     | Infus. 0,3 p. d.<br>1,25 g in 5 T.                   |
| 87  | C. R. 31 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Insufficiencia cordis    | Starke allgem.<br>Stauungen                  | 5:18                       | Digipur. 0,4 p. d.<br>dann weniger<br>1,3 g in 6 T.  |
| 88  | N. S. 23 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                             | Dyspnoe<br>Herzklopfen                       | 5:13                       | Digip. 0,3 p. d.<br>2,5 g in 9 T.                    |
| 89  | G. S. 39 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>Mitralstenose                                                 | Leberschwell.                                | 4:11,5                     | Digipur. 0,4 p. d.<br>dann weniger<br>2,5 g in 10 T. |

| Pulsfrequenz                                         | Diurese                                                            | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. T. 108<br>3. T. 92<br>5. T. 68                    | 1. T. 2700<br>2. T. 3300<br>3. T. 1000<br>Einfuhr 1500             | Erbrechen                       | Besserung                                                     |
| 1. T. 116<br>3. T. 84<br>4. T. 64<br>6. T. 72        | 1. T. 900<br>2. T. 1000<br>4. T. 650<br>6. T. 1000<br>Einfuhr 1500 | Schwindel<br>Uebelkeit          | Keine deutliche<br>Wirkung, auf<br>Theocin bessere<br>Diurese |
| 1. T. 100<br>2. T. 80<br>4. T. 64                    | 1. T. 400<br>3. T. 500<br>6. T. 600<br>Einfuhr 1500                | —                               | Ausser Puls-<br>verlangsamung<br>keine Aenderung              |
| 1. T. 64<br>4. T. 60<br>bleibt                       | 1. T. 1100<br>4. T. 2300<br>Einfuhr 1400                           | —                               | Besserung                                                     |
| 1. T. 66<br>2. T. 76<br>4. T. 100                    | 1. T. 600<br>4. T. 900<br>7. T. 1400<br>Einfuhr 1200               | —                               | Keine wesentl.<br>Besserung                                   |
| 1. T. 112<br>3. T. 80<br>5. T. 64                    | 1. T. 600<br>4. T. 2000<br>Einfuhr 1500                            | —                               | Besserung                                                     |
| 1. T. 138<br>5. T. 114<br>7. T. 104<br>bleibt um 100 | 1. T. 900<br>2. T. 1400<br>4. T. 2060<br>Einfuhr 1000—1500         | —                               | Wohlbefinden                                                  |
| 1. T. 60<br>2. T. 56<br>3. T. 46                     | 2. T. 750<br>4. T. 1100<br>Einfuhr 1500<br>Diurese bleibt gut      | —                               | Besserung                                                     |
| 1. T. 100<br>4. T. 92<br>8. T. 72                    | 2. T. 2000<br>4. T. 2100<br>Einfuhr 1250—1500                      | —                               | Kompensation                                                  |
| ständig<br>zwischen<br>70 u. 80                      | 1. T. 1400<br>3. T. 1500<br>Einfuhr 1700                           | —                               | Keine<br>Aenderung                                            |

| No. | Diagnose                                                                         | Folge-<br>erscheinungen                                       | Herzgrenzen | Therapie                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 90  | R. W. 36 J.<br>Mitral- u. Aorten-<br>insuffizienz<br>Myokarditis                 | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas                      | 4:13        | Infus. 0,6 p. d.<br>dann weniger<br>2,3 g in 5 T.  |
| 91  | M. P. 54 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose, Aorten-<br>insuffizienz, Lues. | Tachykardie<br>Leberschwell.                                  | 3,5:13,5    | Digipur. 0,4 p. d.<br>2,3 g in 8 T.                |
| 92  | A. L. 39 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose<br>Aorteninsuffizienz           | Allgemeine<br>Stauungen                                       | 6,5:16      | Infus. 0,6 p. d.<br>dann weniger<br>2,2 g in 6. T. |
| 93  | G. J. 35 J.<br>Aorten und<br>Mitralinsuffizienz                                  | Albuminurie                                                   | 4:16        | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,4 g in 5 T.                |
| 94  | W. S. 40 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>u. -stenose<br>Mitralinsuffizienz           | Leber- u. Milz-<br>schwellung<br>leichte Oedeme<br>Bronchitis | 4:12        | Digipur. 0,4 p. d.<br>1,1 g in 3 T.                |
| 95  | K. B. 21 J.<br>Mitral- u. Aorten-<br>insuffizienz                                | Leberschwell.<br>Spur Albumen                                 | 7:15        | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,9 g in 8 T.                |

#### Herzmuskelerkrankungen ohne

|     |                                                         |                                                    |                                    |                                     |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 96  | E. F. 32 J.<br>Myocarditis gravis<br>Mitralinsuffizienz | Irregul., mässige<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen | Dilatation                         | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,9 g in 8 T.    |
| 97  | B. v. K. 56 J.<br>Myocarditis chron.                    | Oedeme<br>Irregularitas<br>Spur Albumen            | Keine<br>wesentliche<br>Dilatation | Pulv. 0,3 p. d.<br>3,4 g in 15 T.   |
| 98  | E. S. 55 J.<br>Myocarditis chron.                       | Dyspnoe<br>Bronchitis                              | Dilatation                         | Digalen 3,0 ccm<br>p. d.            |
| 99  | A. D. 30 J.<br>Myocarditis acuta<br>rheumatica          | Irregularitas<br>Bronchitis                        | Dilatation                         | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,0 g in 9 T.    |
| 100 | K. H. 30 J.<br>Myocarditis chron.                       | Irregularitas<br>cordis                            | Keine<br>Dilatation                | Digipur. 0,2 p. d.<br>1,6 g in 8 T. |

| Pulsfrequenz                                   | Diurese                                              | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 124<br>3. T. 140<br>bleibt frequent      | 1. T. 600<br>3. T. 650<br>Einfuhr 1400               | —                               | Puls wird<br>regulär, sonst<br>keine Wirkung                          |
| 1. T. 122<br>3. T. 100<br>4. T. 60<br>5. T. 96 | 1. T. 1000<br>6. T. 800<br>7. T. 700<br>Einfuhr 1600 | —                               | Ausser vorüber-<br>gehender Puls-<br>verlangsamung<br>keine Aenderung |
| 1. T. 90<br>4. T. 76<br>5. T. 64               | 1. T. 900<br>4. T. 2100<br>Einfuhr 1600              | Uebelkeit<br>Extrasystolen      | Besserung                                                             |
| 1. T. 72<br>3. T. 58                           | 1. T. 1300<br>3. T. 1400<br>Einfuhr 1500             | Uebelkeit                       | Besserung                                                             |
| 1. T. 74<br>2. T. 72<br>3. T. 60               | 1. T. 1100<br>3. T. 710<br>Einfuhr 1200              | Erbrechen                       | Keine Änderung<br>ausser Puls-<br>verlangsamung                       |
| zwischen<br>80 u. 90                           | 2. T. 1500<br>4. T. 1200<br>Einfuhr 1500             | —                               | Etwas<br>Besserung                                                    |

begleitende Arteriosklerose.

|                                    |                                                        |                       |                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1. T. 112<br>3. T. 100<br>4. T. 88 | 2. T. 800<br>3. T. 1200<br>4. T. 700                   | —                     | Besserung                                          |
| 1. T. 104<br>3. T. 76<br>8. T. 60  | 1. T. 1200<br>3. T. 1350<br>8. T. 1400<br>Einfuhr 1250 | Erbrechen<br>Flimmern | Weitgehende<br>Besserung                           |
| 1. T. 100<br>3. T. 72<br>9. T. 44  | 1. T. 1000<br>4. T. 1300<br>10. T. 1400                | Bradykardie           | Besserung                                          |
| 1. T. 60<br>4. T. 56<br>5. T. 52   | 2. T. 1000<br>4. T. 1200<br>6. T. 1800                 | —                     | Besserung                                          |
| 1. T. 116<br>2. T. 92<br>5. T. 72  | 1. T. 1600<br>4. T. 1380<br>Einfuhr 1400               | —                     | Diurese bleibt<br>gut, Wohlbefind.<br>bei Bettruhe |

| No. | Diagnose                                                                | Folge-<br>erscheinungen                                                                     | Herzgrenzen                | Therapie                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | F. M. 42 J.<br>Myokarditis                                              | Dyspnoe<br>Bronchitis<br>Irregularitas                                                      | 4,5 : 11                   | Pulv. 0,3 p. d.<br>3,3 g in 14 T.                                                      |
| 102 | M. M. 34 J.<br>Myokarditis<br>Mitralinsuffizienz                        | Oedeme<br>Spur Albumen<br>Irregularitas<br><br>Nach 14 Tagen                                | 4 : 12                     | Pulv. 0,3 p. d.<br>0,8 g in 3 T.<br><br>Pulv. 0,2, dann<br>0,1 p. d.<br>2,2 g in 19 T. |
| 103 | P. S. 45 J.<br>Myocarditis chron.<br>Mitralinsuffizienz ?               | Oedeme<br>Dyspnoe<br>Spur Albumen                                                           | Keine<br>Dilatation        | Digalen 3,0 ccm<br>p. d.<br>12 ccm in 4 T.                                             |
| 104 | F. W. 44 J.<br>Myocarditis chron.<br>Insufficiencia cordis<br>gravis    | Irregularitas<br>gravis, Oedeme<br>Albumen                                                  | Dilatation<br>n. l. u. r.  | Digipur. 0,5 p. d.<br>dann weniger<br>3,0 g in 9 T.                                    |
| 105 | H. B. 33 J.<br>Myocarditis chron.<br>cor strumosum ?                    | Dyspnoe,<br>Leber leicht<br>druckempfindl.                                                  | 5,5 : 13                   | Infus. 0,5 p. d.<br>2,0 g in 4 T.                                                      |
| 106 | Frau A. B. 66 J.<br>Myocarditis chron.<br>Eccema chron.                 | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen<br>Irregularitas<br><br>Allgemeine<br>Stauungen | 3,5 : 11,5<br><br>4 : 12,5 | Infus. 0,5 p. d.<br>2,5 g in 5 T.<br><br>Infus. 0,5 p. d.<br>5,2 g in 17 T.            |
| 107 | R. F. 57 J.<br>Myocarditis chron.<br>Pleuritis<br>exsudativa dextra     | Irregularitas<br>Allgemeine<br>Stauungen                                                    | 7 : 13                     | Digipur. 0,4 p. d.<br>2,4 g in 8 T.                                                    |
| 108 | S. K. 56 J.<br>Myocarditis chron.<br>Keine deutliche<br>Arteriosklerose | Irregularitas<br>Keine<br>Stauungen                                                         | 4,5 : 11,5                 | Digipur. 0,3 p. d.<br>dann weniger<br>2,5 g in 13 T.                                   |

| Pulsfrequenz                                    | Diurese                                                                  | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. T. 142<br>5. T. 72<br>10. T. 60              | 1. T. 600<br>5. T. 1700<br>Einfuhr 1400                                  | —                               | Besserung                                                                             |
| 1. T. 144<br>4. T. 91                           | 2. T. 500<br>5. T. 1900<br>Einfuhr 1000—1600                             | Erbrechen                       | Gute Diurese<br>Nach 8 Tag. auf<br>0,3 Pulv. p. d.<br>wied. Brechreiz                 |
| 1. T. 90<br>2. T. 80<br>3. T. 78                | 2. T. 1100<br>5. T. 2500<br>Einfuhr 1600                                 | —                               | Gute Wirkung<br>Diurese bleibt<br>gut                                                 |
| 1. T. 66<br>2. T. 52<br>3. T. 44                | 1. T. 900<br>3. T. 1100<br>5. T. 1400                                    | —                               | Etwas<br>Besserung                                                                    |
| 1. T. 88<br>4. T. 72<br>6. T. 60<br>9. T. 50    | 1. T. 800<br>3. T. 1000<br>5. T. 1800<br>9. T. 2600<br>Einfuhr 1400—1500 | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                              |
| 1. T. 84<br>4. T. 72<br>5. T. 61                | 1. T. 800<br>2. T. 900<br>5. T. 600<br>Einfuhr 2000                      | —                               | Keine Wirkung<br>ausser Puls-<br>verlangsamung                                        |
| 1. T. 76<br>3. T. 72<br>5. T. 92<br>6. T. 72    | 2. T. 1500<br>5. T. 2600<br>Einfuhr 2100                                 | —                               | Besserung<br>Nach 5 Monaten<br>starke Herz-<br>insuffizienz                           |
| schwankt<br>zwischen<br>70 u. 100               | 1. T. 600<br>4. T. 1000<br>9. T. 2100<br>Einfuhr 1000—1200               | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                              |
| 2. T. 160<br>3. T. 122<br>6. T. 106<br>9. T. 96 | 2. T. 500<br>4. T. 1400<br>8. T. 1600<br>10. T. 2000<br>Einfuhr 1500     | Bigeminie                       | Besserung<br>Mehr. Wochen<br>später gleicher<br>Erfolg mit 6,2 g<br>Infus. in 4 Woch. |
| 1. T. 104<br>3. T. 80<br>bleibt um 80           | 1. T. 1200<br>3. T. 1500<br>9. T. 1900<br>Einfuhr 1900                   |                                 | Besserung                                                                             |

| No. | Diagnose                                                                  | Folge-<br>erscheinungen                        | Herzgrenzen               | Therapie                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 109 | F. R. 46 J.<br>Myocarditis<br>chronica                                    | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen    | 5,5 : 12                  | Pulv. 0,4 p. d.<br>4,5 g in 16 T.                  |
| 110 | C. W. 44 J.<br>Myocarditis chron.<br>Herzinsuffizienz<br>Lungeninfarkte   | Leberschwell.<br>Spur Albumen<br>Irregularitas | 5 : 14                    | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,0 g in 7 T.                   |
| 111 | F. K. 40 J.<br>Myocarditis acuta<br>Aneurysma Aortae                      | Allgemeine<br>starke Stauung                   | 4,5 : 10,5                | Infus. 0,5 p. d.<br>2,3 g in 6 T.                  |
| 112 | M. S. 55 J.<br>Myocarditis<br>chronica                                    | Allgemeine<br>Stauungen                        | 5 : 11,5                  | Infus. 0,5 p. d.<br>1,7 g in 4 T.                  |
| 113 | J. S. 63 J.<br>Polyarthritis chron.<br>Insufficiencia cordis              | Irregularitas<br>allgemeine<br>Stauungen       | 6 : 14                    | Infus. 0,5 p. d.<br>2,6 g in 6 T.                  |
| 114 | K. W. 44 J.<br>Cor strumosum                                              | Starke allgem.<br>Stauungen<br>Tachykardie     | 4 : 12                    | Infus. 0,8 p. d.,<br>dann weniger<br>2,4 g in 4 T. |
| 115 | F. K. 56 J.<br>Myocarditis<br>chronica                                    | Stauungsleber<br>Spur Albumen                  | 5 : 12                    | Infus. 0,5 p. d.<br>1,9 g in 5 T.                  |
| 116 | F. R. 32 J.<br>Myocarditis chron.<br>Mitralinsuffizienz                   | Allgemeine<br>Stauungen                        | Dilatation<br>n. l. u. r. | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,3 g in 5 T.                   |
| 117 | A. S. 73 J.<br>Myokarditis<br>Asthma cardiale<br>keine<br>Arteriosklerose | Allgem. starke<br>Stauungen                    | 6 : 12                    | Infus. 0,5 p. d.<br>4,0 g in 8 T.                  |
| 118 | Frau P. K. 58 J.<br>Myocarditis<br>chronica                               | Allgemeine<br>Stauungen                        | 4,5 : 12,5                | Infus. 0,5 p. d.<br>3,3 g in 8 T.                  |

| Pulsfrequenz                                                 | Diurese                                                     | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| schwankt<br>zwischen<br>70 u. 100                            | 1. T. 1450<br>4. T. 1700<br>Einfuhr 1100—1400               | —                               | Besserung                                                                                   |
| 1. T. 120<br>5. T. 96<br>8. T. 76                            | 1. T. 1100<br>4. T. 1850<br>5. T. 3500<br>Einfuhr 1100—1500 | —                               | Gute Wirkung                                                                                |
| 1. T. 108<br>3. T. 88<br>5. T. 64                            | 2. T. 700<br>4. T. 2300<br>9. T. 2000<br>Einfuhr 1500       | —                               | Besserung                                                                                   |
| 1. T. 100<br>2. T. 92<br>3. T. 80                            | 1. T. 1500<br>2. T. 4600<br>Einfuhr 1200                    | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                                    |
| bleibt um 80                                                 | 1. T. 800<br>3. T. 2000<br>4. T. 1300<br>Einfuhr 1000—1300  | —                               | Besserung<br>Nach einiger Zeit<br>Digip. 1,6 g in 8 T.<br>ohne eine Aend.<br>hervorzurufen. |
| 1. T. 174<br>3. T. 124<br>5. T. 84<br>7. T. 70               | 1. T. 250<br>3. T. 1900<br>5. T. 1300<br>Einfuhr 1000       | Brechreiz                       | Weitgehende<br>Besserung                                                                    |
| 1. T. 104<br>3. T. 112<br>4. T. 94<br>bleibt<br>beschleunigt | 1. T. 440<br>3. T. 480<br>5. T. 550<br>Einfuhr 1100         | Erbrechen                       | Keine Wirkung                                                                               |
| 1. T. 140<br>3. T. 100<br>5. T. 80<br>8. T. 52               | 1. T. 600<br>4. T. 450<br>6. T. 400<br>Einfuhr 1500         | Erbrechen                       | Subjektiv etwas<br>Besserung                                                                |
| schwankt<br>zwischen<br>90 u. 120                            | 1. T. 1200<br>3. T. 3000<br>5. T. 1900<br>Einfuhr 1200—1800 | —                               | Besserung                                                                                   |
| 1. T. 128<br>4. T. 98<br>6. T. 82<br>8. T. 72                | 2. T. 700<br>3. T. 1800<br>5. T. 1500<br>Einfuhr 1200—1600  | —                               | Etwas<br>Besserung                                                                          |

| No. | Diagnose                                                    | Folge-<br>erscheinungen                          | Herzgrenzen                                                 | Therapie                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 119 | K. Th. 28 J.<br>Myocarditis chron.<br>Insufficiencia cordis | Irregul, Leber-,<br>Milzschwellung<br>Bronchitis | 3 : 12                                                      | Infus. 0,3 p. d.<br>1,7 g in 11 T.                 |
| 120 | A. W. 46 J.<br>Adipositas<br>Herzstörungen                  | Leichte<br>Irregularität<br>Dyspnoe              | Keine<br>Dilatation                                         | Infus. 0,3 p. d.<br>2,2 g in 7 T.                  |
| 121 | J. Z. 51 J.<br>Myokarditis<br>Emphysem<br>Bronchitis        | Irregularitas<br>Stauungen                       | 4,5 : 13,5                                                  | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 6 T.                  |
| 122 | K. F. 37 J.<br>Cor strumosum<br>Mitralinsuffizienz          | Herzklopfen<br>keine<br>Stauungen                | 3 : 12                                                      | Digip. 0,3 p. d.<br>1,8 g in 6 T.                  |
| 123 | F. R. 26 J.<br>Cor strumosum                                | Tachykardie                                      | 3,5 : 9                                                     | Digip. 0,2 p. d.<br>2,2 g in 10 T.                 |
| 124 | J. K. 51 J.<br>Myocarditis<br>chronica                      | Oedeme<br>Spur Altumen<br>Irregularitas          | 4 : 12                                                      | Infus. 0 5 p. d.<br>2,8 g in 7 T.                  |
| 125 | A. H. 28 J.<br>Myokarditis<br>Akute Herzinsuffiz.<br>Lues   | Allgemeine<br>Stauungen                          | 6 : 12,5                                                    | Digipur. 0,2 p. d.<br>3,2 in 15 T.                 |
| 126 | A. W. 15 J.<br>Diphtherie<br>Myokarditis                    | Bradykardie<br>Blutdruck<br>(R.-R.) 80mm Hg      | Dilatation<br>um 3 ccm n. l.<br>gegen Beginn<br>der Krankh. | Infus. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 8 T.                  |
| 127 | L. K. 18 J.<br>Diphtherie<br>Myokarditis                    | Blutdruck<br>80 mm Hg                            | Dilatation                                                  | Infus. 0,4 p. d.<br>2,0 g in 6 T.                  |
| 128 | N. S. 69 J.<br>Pneumonie croup.<br>Pleuritis<br>Myokarditis | Irregularitas<br>Leberschwell.                   | 5 : 11                                                      | Infus. 0,7 p. d.,<br>dann weniger<br>2,8 g in 8 T. |
| 129 | M. B. 66 J.<br>Myokarditis<br>Emphysem<br>Bronchitis        | Leberschwell.<br>Irregularitas                   | 3 : 10                                                      | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 4 T.                |

| Pulsfrequenz                                   | Diurese                                                     | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. T. 84<br>3. T. 70<br>7. T. 60               | 3. T. 1100<br>5. T. 1500<br>Einfuhr 1400                    | —                               | Deutliche<br>Besserung                                      |
| 2. T. 92<br>4. T. 72                           | 1. T. 800<br>4. T. 1500<br>Einfuhr 1300                     | —                               | Etwas<br>Besserung                                          |
| 1. T. 80<br>4. T. 62<br>7. T. 48               | 1. T. 1900<br>2. T. 2250<br>5. T. 1850<br>Einfuhr 1900—2300 | —<br>Bradykardie                | Gute Wirkung                                                |
| ständig um 110                                 | 1. T. 1240<br>2. T. 1700<br>4. T. 1200<br>Einfuhr 2000      | —                               | Keine Wirkung                                               |
| schwankt<br>zwischen<br>80 u. 100              | 2. T. 2000<br>4. T. 2300<br>Einfuhr 2500                    | —                               | Gute Diurese                                                |
| 1. T. 70<br>3. T. 68<br>7. T. 58               | 2. T. 850<br>3. T. 1100<br>Einfuhr 1650                     | —                               | Besserung                                                   |
| 1. T. 112<br>5. T. 98<br>8. T. 92              | 1. T. 1000<br>2. T. 1300<br>7. T. 2600<br>Einfuhr 1350      | —                               | Besserung                                                   |
| schwankt<br>zwischen<br>60 u. 90               | 1. T. 320<br>2. T. 230<br>4. T. 180<br>Einfuhr 650—760      | —                               | Keine Wirkung,<br>auch nicht bei 3<br>and. Versuchen        |
| 1. T. 108<br>4. T. 96<br>7. T. 90              | 1. T. 1270<br>2. T. 1320<br>5. T. 1470<br>Einfuhr 1500—1800 | —                               | Besserung<br>Blutdruck am<br>6. T. 100 mm Hg                |
| 1. T. 170<br>3. T. 138<br>6. T. 80<br>8. T. 64 | 5. T. 1800<br>8. T. 1600<br>Einfuhr 1800—2000               | —                               | Besserung<br>Herzgrenzen 4:9                                |
| schwankt<br>zwischen<br>80 u. 100              | 2. T. 1050<br>3. T. 1500<br>5. T. 900<br>Einfuhr 1500       | —                               | Keine deutliche<br>Wirkung, Herz-<br>aktion wird<br>regulär |

Herzmuskelerkrankungen

| No. | Diagnose                                                      | Folge-<br>erscheinungen                          | Herzgrenzen               | Therapie                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 130 | A. G. 58 J.<br>Arteriosklerose<br>Herzinsuffizienz            | Cyanose<br>Leber-, Milz-<br>schwellung           | Dilatation<br>n. r. u. l. | Pulv. 0,2 p. d.<br>2,0 g in 10 T.              |
| 131 | J. H. 44 J.<br>Polyarthrit<br>rheumatica<br>Herzinsuffizienz  | Leichte Irregu-<br>larität, Leber-<br>schwellung | Dilatation                | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 5 T.               |
| 132 | K. K. 50 J.<br>Myokarditis                                    | Irregularitas<br>Leberschwell.                   | 5:12                      | Infus. 0,2 p. d.<br>0,8 g in 4 T.              |
| 133 | H. P. 72 J.<br>Myodegeneratio<br>cordis                       | Irregularität<br>Oedeme                          | 5,5:10,5                  | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,3 g in 5 T.               |
| 134 | M. S. 60 J.<br>Myocarditis<br>chronica                        | Irregularität<br>allgemeine<br>Stauungen         | 5:13                      | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,0 g in 7 T.               |
| 135 | J. S. 56 J.<br>Myodegeneratio<br>cordis                       | Irregularität<br>allgemeine<br>Stauungen         | 6,5:14                    | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,1 g in 13 T.              |
| 136 | H. A. 57 J.<br>Arteriosclerosis<br>gravis, Angina<br>pectoris | Keine<br>Stauungen                               | 2,5:13                    | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,0 g in 8 T.               |
| 137 | P. B. 60 J.<br>Myocarditis chron.<br>Insufficiencia cordis    | Allgemeine<br>Stauungen<br>Hepar magnum          | Dilatation                | Infus. 0,4 p. d.<br>2,0 g in 6 T.              |
| 138 | N. B. 67 J.<br>Arterio sclerosis<br>cordis et cerebri         | Irregularitas<br>Oedeme<br>Bronchitis            | 4:13                      | Pulv. 0,3 p. d.,<br>dann 0,1<br>1,3 g in 14 T. |
| 139 | H. G. 59 J.<br>Myocarditis<br>chronica                        | Oedeme<br>Spur Albumen                           | 4,5:13                    | Digip. 0,2 p. d.<br>1,0 g in 6 T.              |

bei Arteriosklerotikern.

| Pulsfrequenz                       | Diurese                                                    | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zwischen<br>70 u. 80               | 1. T. 1250<br>3. T. 960<br>5. T. 980                       | —                               | Subjektiv etwas<br>Besserung                                                                                             |
| zwischen<br>70 u. 80               | 2. T. 1400<br>5. T. 1000                                   | Uebelkeit<br>Flimmern           | Keine<br>Besserung                                                                                                       |
| zwischen<br>60 u. 70               | 1. T. 700<br>3. T. 1300<br>4. T. 1175                      | —                               | Besserung                                                                                                                |
| 1. T. 66<br>3. T. 60<br>5. T. 78   | 1. T. 850<br>3. T. 750<br>5. T. 800                        | Dyspepsie                       | Keine Wirkung                                                                                                            |
| 2. T. 130<br>3. T. 100<br>6. T. 88 | 1. T. 1200<br>4. T. 1400                                   | Erbrechen                       | Etw. Besserung<br>Im Anschluss<br>daran chronisch<br>Pulv. 0,2 od. 0,1<br>p. d. mit gutem<br>Erfolg über viele<br>Wochen |
| 1. T. 92<br>3. T. 86<br>5. T. 60   | 1. T. 530<br>3. T. 1300<br>6. T. 1900<br>Einfuhr 1500      | —                               | Besserung                                                                                                                |
| 1. T. 84<br>3. T. 60<br>4. T. 56   | 1. T. 1500<br>3. T. 1000<br>6. T. 2000                     | —                               | Subjekt. Gefühl<br>von Besserung                                                                                         |
| 1. T. 78<br>3. T. 72               | 1. T. 900<br>3. T. 1100<br>7. T. 1000<br>Einfuhr 1500—1700 | —                               | Mäss. Wirkung<br>Auf Theocin<br>bess. Diurese                                                                            |
| 1. T. 80<br>4. T. 60<br>5. T. 70   | 2. T. 2300<br>4. T. 1800<br>10. T. 1500<br>Einfuhr 1500    | —                               | Besserung                                                                                                                |
| 1. T. 102<br>3. T. 90<br>4. T. 84  | 1. T. 1000<br>3. T. 1550<br>4. T. 1250                     | Appetitlosigkeit<br>Flimmern    | Geringe<br>Besserung                                                                                                     |

| No. | Diagnose                                                                   | Folge-<br>erscheinungen                      | Herzgrenzen         | Therapie                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 140 | K. H. 61 J.<br>Myodegeneratio<br>et Insufficiencia<br>cordis               | Starke<br>Stauungs-<br>erscheinungen         | 5,5 : 14            | Digip. 0,4 p. d.,<br>dann weniger<br>3,1 g in 28 T. |
| 141 | G. K. 65 J.<br>Arteriosklerose<br>Koronarsklerose<br>Insufficiencia cordis | Allgemeine<br>Stauungen                      | 4 5 : 11            | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,4 g in 6 T.                    |
| 142 | V. M. 65 J.<br>Asthma cardiale<br>Insufficiencia cordis                    | Oedeme<br>Leberschwell.<br>Bronchitis        | Dilatatio           | Digalen 5,0 ccm<br>p. d.                            |
| 143 | L. M. 69 J.<br>Arteriosclerosis<br>gravis, Insufficiencia<br>cordis        | Allgemeine<br>starke Stauung.                | 5 : 10              | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 6 T.                   |
| 144 | G. M. 61 J.<br>Myodegeneratio et<br>Insufficiencia cordis<br>Emphysem      | Starke allgem.<br>Stauungen<br>Irregularitas | 5,5 : 12,5          | Digip. 0,4 p. d.,<br>dann weniger<br>1,3 g in 5 T.  |
| 145 | K. R. 59 J.<br>Myokarditis<br>Tuberculosis<br>pulmonum                     | Starke allgem.<br>Stauungen                  | 3 : 12              | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 5 T.                    |
| 146 | R. S. 60 J.<br>Myocarditis<br>chronica                                     | Oedeme<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen      | Dilatation          | Digip. 0,3 p. d.<br>3,0 g in 11 T.                  |
| 147 | E. S. 50 J.<br>Arteriosklerose<br>Insufficiencia cordis                    | Leberschwell.<br>Albumen<br>Dyspnoe          | 4 : 12              | Digip. 0,4 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                   |
| 148 | A. W. 66 J.<br>Adams-Stokessche<br>Krankheit                               | Bradykardie<br>keine Stauungen               | Keine<br>Dilatation | Infus. 0,3 p. d.,<br>dann weniger<br>2,5 g in 11 T. |
| 149 | C. W. 53 J.<br>Myodegeneratio<br>cordis                                    | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas     | Keine<br>Dilatation | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 5 T.                    |

| Pulsfrequenz                                | Diurese                                                                 | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der ersten<br>Woche um 80,<br>dann um 70 | 1. T. 680<br>3. T. 1100<br>10. T. 1350<br>Einfuhr 1500                  | —                               | Gute Diurese<br>bei 0,1 Digipur.<br>alle 2 Tage.                                         |
| um 70, keine<br>Schwankungen                | 1. T. 1500<br>3. T. 1500<br>Einfuhr 1350—1600                           | —                               | Diurese ständig<br>gut, Stenokardie<br>u. Stauungen<br>geringer                          |
| 1. T. 84<br>2. T. 72<br>8. T. 66            | 1. T. 800<br>3. T. 1200<br>4. T. 2600                                   | Brechreiz<br>Uebelkeit          | Besserung                                                                                |
| 1. T. 144<br>3. T. 80<br>5. T. 62           | 2. T. 400<br>3. T. 4000<br>4. T. 2000<br>5. T. 600<br>Einfuhr 1250—1500 | —                               | Diurese bleibt<br>schlecht. Nach<br>8 T. 2,0 g Digip.<br>in 6 T. Gute Diur.<br>Besserung |
| 1. T. 100<br>3. T. 80<br>bleibt             | 1. T. 1400<br>3. T. 2000<br>6. T. 1700                                  | Bigeminie                       | Zunehm. Bess.<br>bis zum Exitus<br>subitus                                               |
| 1. T. 84<br>3. T. 78<br>5. T. 120           | 1. T. 1290<br>3. T. 1510<br>5. T. 1210<br>Einfuhr 1400—1600             | —                               | Keine<br>Besserung                                                                       |
| 1. T. 104<br>3. T. 84<br>5. T. 72           | 1. T. 1100<br>3. T. 1600<br>6. T. 1300<br>Einfuhr 1500—1600             | —                               | Besserung                                                                                |
| 1. T. 102<br>3. T. 90<br>5. T. 74           | 1. T. 620<br>3. T. 1800<br>5. T. 1300<br>6. T. 800<br>Einfuhr 1300—1500 | Flimmern                        | Diurese bleibt<br>schlecht                                                               |
| Puls zwischen<br>40 u. 46                   | 1. T. 720<br>3. T. 900<br>6. T. 800                                     | —                               | Objektiv keine<br>Aenderung                                                              |
| 1. T. 126<br>3. T. 96<br>5. T. 84           | 1. T. 500<br>3. T. 1300<br>6. T. 3000                                   | —                               | Besserung<br>Irregularitas<br>bleibt                                                     |

| No. | Diagnose                                                                        | Folge-<br>erscheinungen                      | Herzgrenzen                   | Therapie                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 150 | J. W. 53 J.<br>Arteriosklerosis                                                 | Dyspnoe<br>Herzklopfen<br>Keine<br>Stauungen | 3,5 : 10                      | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,1 g in 7 T.                         |
| 151 | K. Z. 66 J.<br>Koronarsklerose                                                  | Angina pectoris<br>Keine<br>Stauungen        | 4,5 : 12,5                    | Digipur. 0,3 p. d.<br>2,2 g in 8 T.                      |
| 152 | E. G. 67 J.<br>Myodegeneratio<br>cordis, Emphysem<br>Bronchitis                 | Oedeme<br>Irregularität<br>Spur Albumen      | Dilatation                    | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,4 g in 12 T.                        |
| 153 | P. H. 51 J.<br>Myocarditis chron.                                               | Allgem. starke<br>Stauungen<br>Irregularität | 3 : 14                        | Digipur. 0,3 p. d.,<br>dann 0,15<br>i. t. 2,6 g in 14 T. |
| 154 | J. J. 68 J.<br>Arteriosklerose<br>Mitralinsuffizienz<br>Decompensatio<br>gravis | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularitas     | 3 : 15                        | Infus. 0,5 p. d.<br>1,3 g in 3 T.                        |
| 155 | B. K. 43 J.<br>Insufficiencia<br>Myokarditis<br>Mitralinsuffizienz              | Allgemeine<br>Stauungen                      | 7 : 13,5                      | Infus. 0,5 p. d.<br>3,3 g in 11 T.                       |
| 156 | W. K. 47 J.<br>Myokarditis                                                      | Leberschwell.<br>Bronchitis                  | 5 : 10,5                      | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,6 g in 11 T.                        |
| 157 | J. L. 69 J.<br>Arteriosklerose                                                  | Irregularitas<br>Milztumor                   | Dilatation<br>n. l.           | Infus. 0,4 p. d.<br>2,8 g in 9 T.                        |
| 158 | G. M. 42 J.<br>Angina pectoris                                                  | Spur Albumen<br>Keine<br>Stauungen           | 3 : 12,5                      | Pulv. 0,3 p. d.<br>2,3 g in 8 T.                         |
| 159 | J. N. 60 J.<br>Asthma cardiale                                                  | Leberschwell.                                | Starke<br>Dilatation<br>n. l. | Infus. 0,5 p. d.<br>2,5 g in 6 T.                        |

| Pulsfrequenz                         | Diurese                                                                                | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 60<br>3. T. 72<br>5. T. 84     | 1. T. 1200<br>3. T. 2100<br>8. T. 1400<br>Einfuhr 1250—2000                            | Erbrechen                       | Etwas<br>Besserung                                                                                                 |
| 2. T. 86<br>4. T. 72<br>8. T. 70     | 1. T. 1750<br>2. T. 2100<br>5. T. 2400<br>bleibt gut                                   | —                               | Subjektiv<br>gebessert                                                                                             |
| 1. T. 110<br>2. T. 90<br>5. T. 76    | 1. T. 1420<br>3. T. 2150<br>bleibt gut<br>Einfuhr 1200—1400                            | —                               | Besserung                                                                                                          |
| 1. T. 122<br>4. T. 80<br>6. T. 72    | 1. T. 1000<br>3. T. 2400<br>5. T. 3800<br>Einfuhr 1000—1500                            | Erbrechen                       | Besserung, spät.<br>chronisch tinct.<br>stroph. mit<br>gutem Erfolg                                                |
| 2. T. 92<br>5. T. 72<br>6. T. 66     | 1. T. 2150<br>2. T. 5600<br>5. T. 2000                                                 | Uebelkeit                       | Besserung, gute<br>Diurese, $\frac{1}{2}$ Jahr<br>spät. mit 0,3 Dig.<br>p. d., 1,7 g in 6 T.,<br>d. gleiche Erfolg |
| 1. T. 92<br>2. T. 80<br>bleibt um 80 | 1. T. 1200<br>2. T. 2500<br>3. T. 3200<br>7. T. 1000<br>8. T. 800<br>Einfuhr 1000—1400 | —                               | Befinden gut<br>Diurese wird<br>schlecht, Irrreg.<br>besteht                                                       |
| 1. T. 72<br>2. T. 60<br>4. T. 54     | 1. T. 900<br>2. T. 1100<br>6. T. 1600<br>Einfuhr 1250—1450                             | —                               | Besserung                                                                                                          |
| 1. T. 84<br>2. T. 78<br>4. T. 66     | 1. T. 1210<br>2. T. 1310<br>Einfuhr 1400                                               | —                               | Wesentliche<br>Besserung                                                                                           |
| zwischen<br>80 u. 100                | 1. T. 1500<br>2. T. 1600<br>Einfuhr 1500—1900                                          | —                               | Diurese<br>bleibt gut                                                                                              |
| 1. T. 72<br>5. T. 66<br>6. T. 64     | 1. T. 1050<br>4. T. 980<br>Einfuhr 1200                                                | —                               | Besserung                                                                                                          |

| No. | Diagnose                                                   | Folge-<br>erscheinungen                  | Herzgrenzen | Therapie                                             |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 160 | K. S. 47 J.<br>Koronarsklerose<br>Herzinsuffizienz         | Allgemeine<br>Stauungen                  | 5,5 : 14    | Digipur. 0,3 p. d.<br>2,7 g in 12 T.                 |
| 161 | L. S. 70 J.<br>Arteriosklerose<br>Herzinsuffizienz         | Irregularität<br>Oedeme                  | 6 : 10,5    | Infus. 0,5 p. d.,<br>später 0,1<br>3,7 g in 16 T.    |
| 162 | A. S. 69 J.<br>Myocarditis chron.<br>Nephritis chronica    | Irregularitas<br>Allgemeine<br>Stauungen | 6 : 15      | Digipur. 0,3 p. d.<br>später 0,1<br>6,1 g in 29 T.   |
| 163 | A. N. 68 J.<br>Myocarditis chron.<br>Nephritis chronica    | Allgemeine<br>Oedeme<br>Bronchitis       | 4,5 : 11,5  | Infus. 0,4 p. d.<br>2,2 g in 8 T.                    |
| 164 | J. A. 50 J.<br>Myokarditis<br>Insufficiencia cordis        | Dyspnoe<br>Leberschwell.<br>Albumen      | 5 : 12,5    | Infus. 0,5 p. d.,<br>dann weniger<br>3,45 g in 10 T. |
| 165 | M. S. 65 J.<br>Myocarditis chron.<br>Asthma cardiale       | Stauungsleber<br>Bronchitis<br>Albumen   | 3,5 : 7,5   | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 6 T.                    |
| 166 | J. S. 62 J.<br>Myocarditis chron.<br>Insufficiencia cordis | Stärkste allgem.<br>Stauungen            | 4,5 : 11,5  | Infus. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 4 T.                    |
| 167 | L. W. 56 J.<br>Myocarditis chron.                          | Allgemeine<br>Stauungen<br>Irregularität | 5,5 : 11,5  | Infus. 0,5 p. d.<br>1,3 g in 3 T.                    |
| 168 | E. W. 52 J.<br>Myocarditis chron.                          | Irregularität<br>Allgemeine<br>Stauungen | 3,5 : 10,5  | Infus. 0,5 p. d.<br>1,3 g in 4 T.                    |
| 169 | M. W. 64 J.<br>Angina pectoris                             | Leichte Oedeme<br>Irregularitas          | 3,5 : 10    | Pulv. 0,3 p. d.<br>0,9 g in 4 T.                     |

| Pulsfrequenz                                                        | Diurese                                                                 | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 124<br>3. T. 118<br>7. T. 104<br>10. T. 96<br>bleibt frequent | 1. T. 600<br>3. T. 1900<br>4. T. 2800<br>Einfuhr 1400                   | —                               | Besserung<br>gute Diurese                                           |
| zwischen<br>60 u. 80                                                | 1. T. 1520<br>4. T. 1600<br>Einfuhr 1350—1800                           | —                               | Besserung                                                           |
| 1. T. 78<br>3. T. 74                                                | 1. T. 730<br>3. T. 1210<br>4. T. 1490<br>6. T. 830                      | —                               | Diurese wird<br>schlechter                                          |
| Puls zwischen<br>80 u. 100                                          | 1. T. 1420<br>3. T. 1300<br>5. T. 600<br>Einfuhr 1500                   | —                               | Diurese wird<br>schlecht<br>keine Wirkung                           |
| bleibt zwischen<br>90 u. 100                                        | 1. T. 700<br>2. T. 3000<br>3. T. 3900<br>5. T. 1000<br>Einfuhr 850—1000 | —                               | Besserung<br>3 Monate später<br>Digipur. 1,4g in<br>5 T. ohne Wirk. |
| 1. T. 104<br>3. T. 92<br>5. T. 84                                   | 1. T. 600<br>6. T. 1200<br>Einfuhr 1500                                 | —                               | Besserung<br>Diurese bleibt<br>in Ordnung                           |
| schwankt<br>zwischen<br>60 u. 80                                    | 2. T. 2000<br>5. T. 2600<br>7. T. 3000<br>Einfuhr 1000—1650             | —                               | Sehr gute<br>Wirkung                                                |
| 1. T. 60<br>2. T. 54                                                | 1. T. 1000<br>2. T. 700<br>4. T. 400<br>Einfuhr 1100—1400               | —                               | Diuresen-<br>verschlecht.                                           |
| 1. T. 74<br>4. T. 68<br>5. T. 54                                    | 1. T. 1400<br>2. T. 3400<br>4. T. 2000<br>Einfuhr 1000—1100             | Erbrechen                       | Besserung                                                           |
| 1. T. 80<br>2. T. 64<br>4. T. 56                                    | 2. T. 1000<br>4. T. 900<br>5. T. 1000<br>Einfuhr 1400                   | —                               | Etwas<br>Besserung                                                  |

| No. | Diagnose                                                        | Folge-<br>erscheinungen                     | Herzgrenzen                        | Therapie                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 170 | Ch. F. B. 59 J.<br>Myocarditis chron.<br>Emphysem<br>Bronchitis | Allgemeine<br>Stauungen                     | 4 : 11,5                           | Infus. 0,4 p. d.<br>1,6 g in 4 T.                    |
| 171 | A. B. 68 J.<br>Myokarditis<br>Schrumpfniere                     | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen | Keine<br>Dilatation                | Infus. 0,3 p. d.<br>1,7 g in 7 T.                    |
| 172 | L. A.<br>Myocarditis chron.                                     | Irregularitas<br>Dyspnoe                    | 4,5 : 11                           | Infus. 0,2 u. 0,1<br>p. d.<br>2,8 g in 17 T.         |
| 173 | G. B. 75 J.<br>Myocarditis chron.<br>Emphysem<br>Bronchitis     | Extrasystolen<br>Leberschwell.              | Dilatation<br>n. r. u. l.<br>11 cm | Digipur. 0,4 p. d.,<br>dann weniger<br>1,8 g in 7 T. |
| 174 | J. B. 52 J.<br>Myokarditis                                      | Bronchitis<br>Leberschwell.                 | 5 : 11                             | Pulv. 0,3 p. d.<br>0,9 g in 3 T.                     |
| 175 | J. D. 63 J.<br>Arteriosklerose<br>Insufficiencia cordis         | Dyspnoe<br>Cyanose                          | 6 : 12,5                           | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,8 g in 8 T.                  |
| 176 | F. E. 67 J.<br>Myocarditis chron.<br>Trikuspidalinsuffiz.       | Irregularitas<br>Allgemeine<br>Stauungen    | 7 : 16                             | Digipur. 0,4 p. d.<br>1,4 g in 4 T.                  |
| 177 | K. E. 59 J.<br>Myocarditis chron.                               | Irregularitas<br>Cyanose<br>Oedeme          | 6 : 13                             | Infus. 0,7 p. d.,<br>später 0,2<br>2,9 g in 7 T.     |
| 178 | J. H. 60 J.<br>Myocarditis chron.                               | Allgemeine<br>Stauungen                     | 6 : 14                             | Infus. 0,5 p. d.<br>2,0 g in 5 T.                    |
| 179 | E. K. 67 J.<br>Myocarditis chron.                               | Allgemeine<br>Stauungen                     | 5 : 11                             | Pulv. 0,3 p. d.<br>0,7 g in 3 T.                     |

| Pulsfrequenz                       | Diurese                                                                 | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| zwischen<br>80 u. 90               | 2. T. 1100<br>3. T. 1300<br>Einfuhr 1400                                | Brechreiz                       | Besserung                  |
| 1. T. 126<br>4. T. 108<br>7. T. 96 | 1. T. 1050<br>4. T. 1200<br>6. T. 1000<br>Einfuhr 1250                  | —                               | Etwas<br>Besserung         |
| 1. T. 72<br>2. T. 68<br>3. T. 60   | 2. T. 2000<br>4. T. 2500<br>5. T. 3000<br>bleibt gut                    | —                               | Gute Wirkung               |
| zwischen<br>70 u. 90               | 1. T. 1800<br>3. T. 1600<br>5. T. 1800<br>Einfuhr 1500—1600             | —                               | Gute Wirkung               |
| 1. T. 86<br>2. T. 72<br>4. T. 60   | 1. T. 1200<br>3. T. 1600<br>Einfuhr 1500                                | —                               | Besserung                  |
| 1. T. 80<br>3. T. 72               | 1. T. 1700<br>2. T. 2700<br>4. T. 2300<br>Einfuhr 1450—1650             | —                               | Weitgehende<br>Besserung   |
| zwischen<br>60 u. 70               | 1. T. 3400<br>3. T. 1600<br>4. T. 800<br>5. T. 400<br>Einfuhr 1000—1400 | —                               | Diurese wird<br>schlecht   |
| um 100                             | 2. T. 700<br>5. T. 700<br>Einfuhr 1200—1500                             | —                               | Gute Diurese               |
| 1. T. 68<br>3. T. 80<br>bleibt     | 1. T. 750<br>3. T. 800<br>5. T. 600<br>Einfuhr 1500                     | —                               | Keine deutliche<br>Wirkung |
| um 80                              | 2. T. 1100<br>3. T. 3500<br>Einfuhr 1500                                | —                               | Besserung                  |

| No. | Diagnose                                                                | Folge-<br>erscheinungen                              | Herzgrenzen | Therapie                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 180 | F. L. 61 J.<br>Myocarditis chron.                                       | Starke allgem.<br>Stauungen                          | 4:12        | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,7 g in 6 T.                              |
| 181 | L. M. 52 J.<br>Adipositas<br>Insufficiencia cordis                      | Allgemeine<br>Stauungen                              | 5:11        | Digipur. 0,3 p. d.<br>3,5 g in 16 T.                             |
| 182 | W. M. 46 J.<br>Myocarditis chron.                                       | Starke<br>Stauungen                                  | 4:14        | Digipur. 0,2 p. d.<br>1,2 g in 7 T.                              |
| 183 | G. R. 52 J.<br>Myokarditis                                              | Leber-, Milz-<br>schwellung<br>Leichte Oedeme        | 6:14        | Digipur. 0,2 p. d.<br>1,7 g in 8 T.                              |
| 184 | C. S. 61 J.<br>Myokarditis                                              | Allgemeine<br>Stauungen                              | 3,5:16      | Digipur. 0,2 p. d.<br>1,3 g in 7 T.                              |
| 185 | F. W. 57 J.<br>Arteriosclerosis<br>Insufficiencia cordis                | Leber-, Milz-<br>schwellung<br>Bronchitis<br>Albumen | 4:11,5      | Infus. 1,0:200,0<br>0,5 p. d., dann<br>weniger<br>3,6 g in 11 T. |
| 186 | L. S. 54 J.<br>Myocarditis chron.                                       | Allgemeine<br>Stauungen                              | 5:18        | Digipur. 0,4 p. d.<br>2,5 g in 9 T.                              |
| 187 | E. J. 47 J.<br>Arteriosklerose<br>Asthma cardiale<br>Nephritis chronica | Bronchitis                                           | 4:12,5      | Digipur. 0,2 p. d.<br>0,9 g in 4 T.                              |
| 188 | W. W. 66 J.<br>Myocarditis chron.                                       | Bronchitis<br>Leberschwell.<br>Spur Albumen          | 3:9         | Digipur. 0,2 p. d.<br>0,6 g in 4 T.                              |
| 189 | J. H. 55 J.<br>Myocarditis chron.<br>Angina pectoris                    | Extrasystolen<br>Leberstauung                        | 4:11,5      | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,3 g in 4 T.                              |

| Pulsfrequenz                     | Diurese                                                     | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. T. 66<br>3. T. 64<br>5. T. 54 | 1. T. 940<br>2. T. 1260<br>4. T. 540<br>Einfuhr 1240—1500   | —                               | Diurese wird<br>schlecht                                   |
| zwischen<br>90 u. 100            | 1. T. 600<br>3. T. 1100<br>6. T. 2100                       | —                               | Gute Wirkung                                               |
| zwischen<br>60 u. 80             | 1. T. 1050<br>3. T. 1600<br>4. T. 2250                      | —                               | Gute Diurese                                               |
| zwischen<br>80 u. 90             | 1. T. 800<br>3. T. 1100<br>5. T. 900<br>Einfuhr 1500        | —                               | Keine wesentl.<br>Wirkung                                  |
| 1. T. 92<br>4. T. 82<br>6. T. 76 | 1. T. 590<br>3. T. 1490<br>5. T. 1310<br>Einfuhr 1500       | Brechreiz                       | Besserung                                                  |
| 1. T. 84<br>3. T. 80<br>7. T. 72 | 1. T. 1000<br>4. T. 2500<br>Einfuhr 1500                    | —                               | Gute Diurese                                               |
| 1. T. 84<br>3. T. 76<br>7. T. 62 | 1. T. 1600<br>2. T. 2400<br>5. T. 1900<br>Einfuhr 1600—2000 | —                               | Besserung                                                  |
| zwischen<br>80 u. 100            | 1. T. 1200<br>2. T. 900<br>4. T. 800                        | —                               | Nach Absetzen<br>der Digitalis<br>Diurese wieder<br>besser |
| um 100                           | 1. T. 1200<br>2. T. 1600<br>4. T. 1400<br>Einfuhr 1300—1500 | —                               | Besserung                                                  |
| um 60                            | 1. T. 2000<br>2. T. 1600<br>Einfuhr 1500—1600               | —                               | Gute Wirkung                                               |

| No.          | Diagnose                                                        | Folge-<br>erscheinungen                                     | Herzgrenzen  | Therapie                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 190          | N. H. 75 J.<br>Myocarditis chron.                               | Allgemeine<br>Stauungen                                     | 4 : 17       | Digipur. 0,4 p. d.<br>1,4 g in 4 T.                   |
| 191          | M. G. 63 J.<br>Myocarditis chron.<br>Paroxysmale<br>Tachykardie | Bronchitis<br>Irregularitas                                 | 3,5 : 10     | Digipur. 0,4 p. d.,<br>dann weniger<br>2,4 g in 10 T. |
| 192          | G. B. 61 J.<br>Myocarditis chron.<br>Herzinsuffizienz           | Allgemeine<br>Stauungen                                     | 4,5 : 15,5   | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,4 g in 5 T.                   |
| 193          | H. W.<br>Myokarditis<br>Mitralstenose ?                         | Keine Stauungen<br>Spur Albumen<br>Irregularitas            | 9,5 n. links | Infus. 0,5 p. d.<br>2,8 g in 6 T.                     |
| Pericarditis |                                                                 |                                                             |              |                                                       |
| 194          | K. W. 40 J.                                                     | Leichte Irregul.<br>Starke<br>Leberschwell.                 | 5 : 11       | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,6 g in 6 T.                   |
| 195          | M. A. 52 J.<br>Tuberkulosis<br>pulmonum                         | Irregularitas<br>Bronchitis<br>Leberschwell.                | 4 : 8,5      | Infus. 0,2 p. d.<br>3,3 g in 15 T.                    |
| 196          | H. G. 27 J.<br>Phthisis pulmonum<br>Pleuritis exsudat.          | Tachykardie<br>starke Leber-<br>schwellung                  | 5 : 10       | Pulv. 0,3 p. d.<br>4,5 g in 24 T.                     |
| 197          | P. F. 53 J.                                                     | Leberschwell.<br>Bronchitis<br>Albumen                      | 6,5 : 15     | Infus. 0,3 p. d.<br>1,3 g in 5 T.                     |
| 198          | B. R. 46 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose                | Leichte allgem.<br>Stauungen<br>Leber-, Milz-<br>schwellung | 4,5 : 12,5   | Infus. 0,3 p. d.<br>3,1 g in 12 T.                    |

| Pulsfrequenz                     | Diurese                                                                 | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 78<br>2. T. 64             | 1. T. 2100<br>2. T. 2600<br>3. T. 1000<br>5. T. 500<br>Einfuhr 909—1400 | Erbrechen                       | Diurese wird<br>schlecht. Später<br>auf 0,2 Digipur.<br>1,2 in 6 T. gute<br>Diurese |
| 1. T. 90<br>3. T. 84<br>5. T. 68 | 1. T. 800<br>3. T. 1400<br>4. T. 1200<br>Einfuhr 1250—1500              | —                               | Gute Wirkung                                                                        |
| 1. T. 92<br>3. T. 84<br>5. T. 70 | 1. T. 2000<br>2. T. 2800<br>4. T. 1500<br>Einfuhr 1300—1500             | —                               | Gute Wirkung                                                                        |
| zwischen<br>70 u. 90             | 1. T. 1350<br>2. T. 1500<br>Einfuhr 1750—2000                           | —                               | Keine deutliche<br>Wirkung                                                          |

exsudativa.

|                                   |                                                             |                       |                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1. T. 120<br>3. T. 96<br>6. T. 84 | 1. T. 340<br>3. T. 720<br>5. T. 660<br>Einfuhr 1200         | Erbrechen<br>Flimmern | Keine<br>Besserung                                   |
| um 100                            | 1. T. 1200<br>3. T. 600<br>6. T. 800<br>Einfuhr 1400—1500   | —                     | Keine Wirkung                                        |
| ständig<br>über 100               | 1. T. 1100<br>3. T. 1800<br>6. T. 1100<br>Einfuhr 1500—1750 | —                     | Keine<br>Besserung                                   |
| zwischen<br>90 u. 110             | 1. T. 1100<br>4. T. 1600<br>Einfuhr 1900                    | Erbrechen             | Etwas<br>Besserung<br>auf Koffein<br>bessere Diurese |
| 1. T. 104<br>3. T. 88<br>7. T. 60 | 1. T. 700<br>2. T. 1000<br>4. T. 650<br>Einfuhr 1500        | —                     | Mäss. Wirkung<br>Diurese bleibt<br>schlecht          |

## Sekundäre Herzinsuffizienzen infolge

| No. | Diagnose                                                                   | Folge-<br>erscheinungen                   | Herzgrenzen           | Therapie                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 199 | E. S. 15 J.<br>Bronchitis gravis<br>Insufficiencia cordis                  | Oedeme<br>Leberschwell.                   | 3,5 : 8,5             | Infus. 0,5 p. d.,<br>dann weniger<br>5,3 g in 27 T. |
| 200 | S. G. 62 J.<br>Emphysem<br>Bronchitis<br>Herzinsuffizienz                  | Keine<br>Stauungen                        | 3,5 : 9,5             | Infus. 0,4 p. d.<br>1,9 g in 6 T.                   |
| 201 | D. R. 51 J.<br>Bronchitis, Adipos.<br>Insuffiz. Myokard.                   | Oedeme<br>Extrasystolen                   | 4 : 10                | Pulv. 0,4 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                    |
| 202 | A. G. 36 J.<br>Kyphoskoliose<br>Bronchitis diffusa                         | Cyanose<br>Dyspnoe                        | Keine<br>Dilatation   | Pulv. 0,2 p. d.<br>1,4 g in 7 T.                    |
| 203 | K. S. 62 J.<br>Pleurit. exsudativa<br>Insufficiencia cordis                | Leberschwell.<br>Albumen<br>Irregularität | 3,5 : 10,5            | Infus. 0,5 p. d.,<br>dann weniger<br>1,6 g in 6 T.  |
| 204 | P. K. 52 J.<br>Tubercul. pulmon.<br>Myokarditis                            | Leberschwell.                             | 3,5 : 10,5            | Infus. 0,3 p. d.<br>2,4 g in 9 T.                   |
| 205 | A. S. 23 J.<br>Tubercul. pulmon.<br>Mitralinsuffizienz<br>u. -stenose      | Cyanose<br>Keine Stauungen                | Geringe<br>Dilatation | Digipur. 0,2 p. d.<br>1,8 g in 9 T.                 |
| 206 | H. J. 37 J.<br>Emphysem<br>Bronchitis<br>Herzinsuffizienz                  | Leberschwell.<br>Spur Albumen<br>Askites  | 6 : 11,5              | Digipur. 0,3 p. d.<br>3,0 g in 12 T.                |
| 207 | M. W. 19 J.<br>Schrumpfung d. l.<br>Pleura. Relative<br>Mitralinsuffizienz | Oedeme                                    | 1,5 : 10,5            | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,7 g in 6 T.                 |
| 208 | M. B. 66 J.<br>Emphysem<br>Bronchitis<br>Herzinsuffizienz                  | Leberschwell.<br>Arythmie                 | 3 : 10                | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 4 T.                 |

von Lungen- und Pleuraerkrankungen.

| Pulsfrequenz                                   | Diurese                                                            | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| ständig über 100                               | 1. T. 800<br>6. T. 1000<br>10. T. 400                              | —                               | Keine<br>Besserung                              |
| zwischen<br>70 u. 90                           | 2. T. 900<br>5. T. 400<br>7. T. 700<br>Einfuhr 1150—1400           | —                               | Keine Wirkung                                   |
| 1. T. 92<br>3. T. 88<br>5. T. 78               | 1. T. 1100<br>4. T. 800<br>Einfuhr 1050—1400                       | —                               | Keine<br>Aenderung                              |
| ständig über 100                               | 1. T. 800<br>4. T. 1000<br>6. T. 900<br>Einfuhr 1550—1750          | —                               | Keine Wirkung                                   |
| schwankt<br>zwischen<br>70 u. 120              | 1. T. 900<br>3. T. 800<br>7. T. 500<br>Einfuhr 900—1000            | Erbrechen                       | Diurese<br>wechselt                             |
| schwankt<br>zwischen<br>90 u. 130              | 1. T. 1600<br>3. T. 950<br>5. T. 460                               | —                               | Keine Wirkung                                   |
| zwischen<br>90 u. 120                          | 1. T. 450<br>5. T. 740<br>Einfuhr 1050—1500                        | —                               | Nach Aussetzen<br>der Digitalis<br>gute Diurese |
| 2. T. 108<br>5. T. 92<br>8. T. 80<br>10. T. 66 | 1. T. 1000<br>4. T. 700<br>5. T. 1000<br>7. T. 950<br>Einfuhr 1500 | —                               | Keine wesentl.<br>Wirkung                       |
| zwischen<br>80 u. 100                          | 2. T. 850<br>4. T. 1480<br>6. T. 1730<br>Einfuhr 1300—1500         | —                               | Gute Wirkung                                    |
| zwischen<br>80 u. 100                          | 2. T. 1050<br>3. T. 1500<br>6. T. 800<br>Einfuhr 1500              | —                               | Herzaktion<br>wird regulär                      |

Chronische Nephritis ohne

| No. | Diagnose                                                                                             | Folge-<br>erscheinungen                      | Herzgrenzen              | Therapie                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 209 | C. S. 27 J.<br>Nephritis chronica<br>Insufficiencia cordis                                           | Allgemeine<br>Stauungen                      | 6 : 9,5                  | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 7 T.                   |
| 210 | M. B. 56 J.<br>Nephritis chronica<br>interstitialis, Herz-<br>insuffizienz, Blut-<br>druck 150 mm Hg | Irregularitas<br>Bronchitis<br>Leberschwell. | 4,5 : 1.<br>Axillarlinie | Infus. 0,3 p. d.<br>3,8 g in 16 T.                  |
| 211 | G. B. 46 J.<br>Druck: 225 mm Hg                                                                      | Irregularitas<br>Allgemeine<br>Stauungen     | 3,5 : 12,5               | Digipur. 0,3 p. d.<br>2,3 g in 9 T.                 |
| 212 | W. B. 26 J.<br>Nephritis chronica<br>Pericarditis sicca<br>Druck: 200 mm Hg                          | Geringe<br>Oedeme                            | 3 : 13                   | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,8 g in 6 T.                 |
| 213 | K. B. 44 J.<br>Mitralinsuffizienz<br>Druck: 140 mm Hg                                                | Bronchitis<br>Leberschwell.                  | 1,5 : 14                 | Infus. 0,3 p. d.<br>1,8 g in 6 T.                   |
| 214 | F. H. 49 J.<br>Druck: 175 mm Hg                                                                      | Starke Oedeme                                | 7,5 : 15,5               | Infus. 0,4 p. d.,<br>dann weniger<br>2,7 g in 11 T. |
| 215 | T. V. 42 J.<br>Schrumpfniere                                                                         | Tachykardie<br>Leberschwell.                 | 3,5 : 13                 | Infus. 0,4 p. d.<br>1,8 g in 5 T.                   |
| 216 | A. S. 38 J.<br>Granularatrophie                                                                      | Allgemeine<br>Stauungen                      | 4 : 9                    | Digipur. 0,2 p. d.<br>2,0 g in 10 T.                |
| 217 | A. J. 44 J.<br>Schrumpfniere                                                                         | Tachykardie<br>Leberschwell.                 | Dilatation               | Digipur. 0,3 p. d.<br>2,1 g in 9 T.                 |
| 218 | L. K. 36 J.<br>Urämia chronica<br>Druck: 315 H <sub>2</sub> O                                        | Bronchitis                                   | 4 : 12,5                 | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 7 T.                   |
| 219 | F. M. 33 J.<br>Druck: 160 mm Hg                                                                      | Allgemeine<br>Stauungen                      | 6 : 14                   | Infus. 0,3 p. d.<br>1,7 g in 5 T.                   |

nachweisbare Arteriosklerose.

| Pulsfrequenz                      | Diurese                                                     | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. T. 112<br>4. T. 92<br>6. T. 84 | 1. T. 1000<br>3. T. 2200<br>5. T. 3000<br>Einfuhr 1500      | Schwindel<br>Uebelkeit          | Besserung                   |
| zwischen<br>80 u. 90              | 1. T. 1200<br>3. T. 2000<br>4. T. 1700<br>Einfuhr 1200—2000 | —                               | Weitgehende<br>Besserung    |
| 1. T. 96<br>3. T. 88<br>5. T. 80  | 1. T. 600<br>3. T. 3200<br>4. T. 2800<br>Einfuhr 1250       | —                               | Sehr gute<br>Wirkung        |
| 1. T. 108<br>3. T. 94<br>4. T. 82 | 1. T. 1750<br>3. T. 1200<br>5. T. 800<br>Einfuhr 1200—800   | Erbrechen                       | Subjektive<br>Besserung     |
| 1. T. 102<br>3. T. 96<br>5. T. 78 | 1. T. 1200<br>2. T. 1600<br>4. T. 2800<br>Einfuhr 1400      | Erbrechen                       | Besserung                   |
| um 70                             | 1. T. 4000<br>3. T. 2600                                    | —                               | Sehr gute<br>Wirkung        |
| 1. T. 100<br>2. T. 96<br>4. T. 80 | 1. T. 1220<br>4. T. 950                                     | Uebelkeit                       | Keine wesentl.<br>Aenderung |
| zwischen<br>80 u. 100             | 2. T. 2200<br>4. T. 2600<br>bleibt gut                      |                                 | Gute Wirkung                |
| 1. T. 100<br>3. T. 90<br>7. T. 78 | 1. T. 1950<br>4. T. 1520<br>bleibt                          | —                               | Besserung                   |
| 1. T. 100<br>3. T. 72<br>6. T. 60 | 1. T. 1300<br>3. T. 2100<br>5. T. 1900                      | Brechreiz                       | Gute Diurese                |
| um 90                             | 1. T. 1200<br>2. T. 2700<br>5. T. 1800                      | —                               | Besserung                   |

| No.           | Diagnose                                                                             | Folge-<br>erscheinungen                   | Herzgrenzen | Therapie                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 220           | M. R. 46 J.<br>Perikarditis<br>Pleuritis<br>Druck: 170 mm Hg                         | Allgemeine<br>Stauungen                   | 5,5 : 11    | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 8 T.                   |
| 221           | T. S. 42 J.<br>Druck: 200 mm Hg                                                      | Bronchitis<br>Starke Leber-<br>schwellung | 5 : 13,5    | Infus. 0,5 p. d.<br>3,5 g in 7 T.                   |
| 222           | E. W. 48 J.<br>Schrumpfniere<br>Herzinsuffizienz<br>Druck: 250 mm Hg                 | Irregularität<br>Oedeme                   | 7,5 : 13    | Infus. 0,5 p. d.<br>2,1 g in 5 T.                   |
| 223           | B. W. 30 J.<br>Druck: 185 mm Hg                                                      | Stauungen                                 | 4 : 9,5     | Infus. 0,5 p. d.<br>2,5 g in 9 T.                   |
| 224           | E. S. 18 J.<br>Nephritis chronica<br>parenchymatosa<br>Pleurit. exsudativa<br>dextra | Geringe<br>Stauungen                      | 3 : 10      | Digipur. 0,2 p. d.<br>1,5 g in 7 T.                 |
| 225           | J. S. 28 J.<br>Nephritis chronica<br>Druck: 165 mm Hg                                | Bronchitis<br>Leber-, Milz-<br>schwellung | 4 : 12      | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,3 g in 8 T.                 |
| 226           | M. K. 27 J.<br>Druck: 140 mm Hg                                                      | Oedeme<br>Leberschwell.                   | 3,5 : 10    | Infus. 0,5 p. d.,<br>dann weniger<br>3,8 g in 13 T. |
| 227           | A. B. 40 J.<br>Druck: 210 mm Hg                                                      | Leichte Oedeme<br>Leberschwell.           | 4,5 : 13    | Digipur. 0,3 p. d.<br>1,2 g in 4 T.                 |
| 228           | C. H. 41 J.<br>Pleuritis dextra<br>Druck: 200 mm Hg                                  | Tachykardie                               | 4 : 10      | Infus. 0,3 p. d.<br>3,6 g in 12 T.                  |
| Nephritis mit |                                                                                      |                                           |             |                                                     |
| 229           | K. G. 58 J.<br>Druck: 220 mm Hg                                                      | Leberschwell.                             | 3,5 : 9,5   | Infus. 0,4 p. d.,<br>dann weniger<br>2,7 g in 11 T. |

| Pulsfrequenz                                 | Diurese                                                                  | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| um 100                                       | 1. T. 1240<br>2. T. 2210<br>4. T. 520<br>bleibt schlecht                 | Erbrechen                       | Mässige<br>Wirkung                                                              |
| schwankt<br>zwischen<br>60 u. 100            | 1. T. 1900<br>4. T. 1700<br>Einfuhr 1500                                 | —                               | Gute Wirkung                                                                    |
| um 100                                       | 1. T. 2500<br>4. T. 2600<br>Einfuhr 1500—1900                            | Erbrechen                       | Sehr gute<br>Wirkung                                                            |
| 1. T. 84<br>3. T. 80<br>5. T. 76<br>9. T. 66 | 1. T. 500<br>4. T. 1100<br>5. T. 1200<br>Einfuhr 1200—1600<br>bleibt gut | Uebelkeit                       | Etwas<br>Besserung                                                              |
| 1. T. 100<br>3. T. 96<br>7. T. 86            | 1. T. 760<br>2. T. 1300<br>6. T. 1550<br>7. T. 500<br>Einfuhr 1250—1500  | —                               | Diurese wird<br>schlecht. Später<br>auf 1,8 g Infus.<br>in 5 T. gute<br>Diurese |
| zwischen<br>90 u. 110                        | 1. T. 2100<br>3. T. 1750<br>7. T. 1950<br>Einfuhr 1750                   | —                               | Gute Wirkung                                                                    |
| 1. T. 80<br>4. T. 76<br>5. T. 68             | 1. T. 820<br>4. T. 900<br>Einfuhr 1250—1350                              | —                               | Diurese wird<br>bei salzarmer<br>Kost besser                                    |
| um 80                                        | 1. T. 1800<br>3. T. 900<br>4. T. 1030<br>Einfuhr 1000—1500               | —                               | Etwas<br>Besserung                                                              |
| über 100                                     | 1. T. 1100<br>2. T. 1820<br>6. T. 1400<br>Einfuhr 1750                   | —                               | Besserung                                                                       |
| <b>Arteriosklerose.</b>                      |                                                                          |                                 |                                                                                 |
| um 80                                        | 1. T. 1400<br>3. T. 2100<br>Einfuhr 1550                                 | —                               | Gute Wirkung                                                                    |

| No. | Diagnose                                                         | Folge-<br>erscheinungen          | Herzgrenzen        | Therapie                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 230 | G. T. 42 J.<br>Chronische Urämie<br>Druck: 200 mm Hg             | Irregularität<br>Cyanose         | 4:13               | Infus. 0,5 p. d.<br>3,0 g in 7 T.                  |
| 231 | J. V. 61 J.<br>Aorteninsuffizienz<br>Schrumpfniere               | Dyspnoe<br>Herzklopfen<br>Oedeme | 5,5:15,5           | Pulv. 0,3 p. d.<br>1,3 g in 5 T.                   |
| 232 | W. M. 55 J.<br>Emphysem<br>Bronchitis<br>Druck: 175 mm Hg        | Allgemeine<br>Stauungen          | Dilatation         | Infus. 0,3 p. d.<br>2,7 g in 10 T.                 |
| 233 | M. J. 51 J.<br>Druck: 170 mm Hg                                  | Bronchitis<br>Oedeme             | 3:14               | Infus. 0,4, dann<br>weniger p. d.<br>2,4 g in 7 T. |
| 234 | J. B. 40 J.<br>Schrumpfniere<br>Druck: 215 mm Hg                 | Bronchitis<br>Oedeme             | 5:12 $\frac{1}{2}$ | Digipur. 0,4 p. d.<br>2,9 g in 8 T.                |
| 235 | C. H. 41 J.<br>Pleuritis dextra<br>Druck: 200 mm Hg              | Oedeme                           | 4:10               | Infus. 0,3 p. d.<br>3,6 g in 12 T.                 |
| 236 | J. J. 54 J.<br>Druck: 220 mm Hg                                  | Allgemeine<br>Stauungen          | 6,5:12             | Infus. 0,4 p. d.<br>2,5 g in 9 T.                  |
| 237 | W. K. 52 J.<br>Myocarditis chron.<br>Druck: 185 mm Hg            | Allgemeine<br>Stauungen          | 3:10,5             | Infus. 0,4 p. d.<br>2,3 g in 7 T.                  |
| 238 | A. M. 61 J.<br>Bronchitis chronica<br>Druck: 160 mm Hg           | Oedeme<br>Inäqualität            | Dilatation         | Infus. 0,5 p. d.,<br>dann weniger<br>1,4 g in 4 T. |
| 239 | R. S. 62 J.<br>Urämie, Herz-<br>insuffizienz<br>Druck: 220 mm Hg | Bronchitis<br>Leberschwell.      | 4:12               | Infus. 0,3 p. d.<br>1,5 g in 5 T.                  |
| 240 | G. B. 41 J.<br>Schrumpfniere<br>Herzinsuffizienz                 | Dyspnoe<br>Angina pectoris       | 5,5:10,5           | 3 ccm Digalen<br>24 ccm in 9 T.                    |

| Pulsfrequenz                                  | Diurese                                                    | Intoxikations-<br>erscheinungen | Resultat                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. T. 78<br>2. T. 72<br>bleibt                | 2. T. 1300<br>4. T. 2050<br>6. T. 500<br>Einfuhr 1500      | —                               | Diurese wird<br>schlechter                                                              |
| 1. T. 120<br>2. T. 84<br>4. T. 72<br>5. T. 68 | 1. T. 1000<br>3. T. 1100<br>5. T. 900<br>Einfuhr 1100      | Erbrechen                       | Etwas<br>Besserung                                                                      |
| schwankt<br>zwischen<br>90 u. 120             | 1. T. 1000<br>2. T. 1200<br>Einfuhr 500—850                | —                               | Gute Diurese                                                                            |
| 1. T. 96<br>4. T. 90<br>6. T. 80              | 1. T. 850<br>4. T. 2000<br>7. T. 2100<br>Einfuhr 1750—2000 | —                               | Besserung                                                                               |
| 1. T. 100<br>4. T. 82<br>6. T. 72             | 1. T. 2200<br>3. T. 2600<br>Einfuhr 2200                   | Uebelkeit                       | Besserung                                                                               |
| über 100                                      | 1. T. 1100<br>2. T. 1820<br>6. T. 1400<br>Einfuhr 1750     | —                               | Besserung                                                                               |
| 1. T. 100<br>2. T. 84<br>4. T. 60<br>6. T. 56 | 1. T. 900<br>2. T. 1700<br>4. T. 2250<br>Einfuhr 2000      | —                               | Sehr gute<br>Wirkung                                                                    |
| zwischen<br>80 u. 100                         | 3. T. 1650<br>6. T. 2200<br>Einfuhr 2000                   | —                               | Sehr gute<br>Wirkung                                                                    |
| zwischen<br>70 u. 80                          | 1. T. 800<br>2. T. 1400<br>4. T. 1000<br>Einfuhr 800       | Erbrechen<br>Arythmie           | Diur. ist befried.<br>ebenso noch 2×<br>spät. bei 1,8 Inf. in<br>7 T., 1,9 Inf. in 8 T. |
| 2. T. 100<br>4. T. 92<br>5. T. 88             | 2. T. 400<br>4. T. 800<br>Einfuhr 1050—1500                | —                               | Keine Wirkung                                                                           |
| 1. T. 96<br>3. T. 84<br>6. T. 70              | 1. T. 600<br>2. T. 1300<br>3. T. 2000                      | —                               | Weitgehende<br>Besserung                                                                |

## **Lebenslauf.**

Ich bin am 11. August 1888 in Marburg an der Lahn geboren. 1894—1906 besuchte ich das Gymnasium in Barmen und seine Vorschule und bestand Ostern 1906 das Abiturium. Ostern 1906 bis Ostern 1909 war ich in Erlangen immatrikuliert, bestand hier im August 1908 das Physikum. Sommersemester 1909 studierte ich in Heidelberg, Wintersemester 1909/10 in Leipzig. Ostern 1910 bis Ostern 1911 wieder in Heidelberg, wo ich am 30. Mai 1911 die Staatsprüfung bestand. Während des Medizinalpraktikantenjahres, das ich am 7. Juni 1912 beschloss, war ich an der medizinischen Klinik in Heidelberg beschäftigt. Ich promovierte am 13. Juni 1912.

**Theophil Schrenk.**



